



## PRAEFAMEN.

**Q**ui Terentium Varronem, ut sarcinas colligat, monuit annus, non solum mihi eiusdem rei monitor fuit, et nunc, dum primum supra illum superavi, vere est; sed simul, ut, quae reserent inter meas scriptiunculas, rei medicae fructuosas a me habitas, publico offeram, et exponam, quemadmodum ille Fundaniae suae agriculturae praecepta exposuit.

Restat autem Dissertatio de Febré miliari, quae Purpura alba nuncupatur: de qua quidem celeberrimi viri non pauci doctissime disseruerunt; mira tamen et infinita



## PRAEFAMEN.

*nita discrepantia. Hic enim miasma venenosum constituit causam morbi huius deleterii: alius serum sanguinis acre vel acidum. Hic malum hystericum morbo adesse negat, antihystericis tamen remediis cum fructu utitur. Alius antihysterica remedia causam purpurae albae in puerperis habet. Alii periculosissimus est morbus sollicite tractandus. Alter eius sollicitam curam gerendam esse negat. Quanta discrepantia in febre adeo fontica!*

*Nihilominus, licenter, audax, numerum auxi, et discrepantiae meae summam, nuper in Acta nova Physico-medica Nat. Cur. inferendam, ad praelibandum tradidi. Reliqua de hoc morbo, in ordinem quendam congesta, accipe nunc Lector, et an in publicum commodum valeant, iudica; et, si fors, iis utere, et vale. Si non, proba voluntatem, et iterum vale.*



2284/11  
SCIAGRAPHIA TRACTATVS

DE

FIBRE MILIARI, PURPURA  
ALBA DICTA

IOHANNIS BERNHARDI DE FISCHER,

RVSSIAE QVONDAM ARCHIATRI, ET IMPERA-  
TRICIS ANNAE PERSONAE MEDICI.



§. I. *Praefamen.* Octogesium aetatis an-  
num agens Terentium Varronem imitatus sum,  
qui hoc aetatis anno sarcinas colligendas esse pu-  
tauit, et ideo, quae habuit agriculturae praece-  
pta Fundaniae suae reliquit. Ita, quae habeo in-  
ter scriptiunculas meas, reliquas, olim fructuo-  
sas a me habitas, publico offerendas esse puto.  
Praemitto autem nunc eo lubentius de hoc opu-  
sculo hanc Sciagraphiam, eodem modo, quo  
secundae editioni Erfordienfi Tractatus mei de  
Senio illam praemisi, quia obseruavi hac me-  
thodo etiam vsum fuisse Auctorem quendam  
Anglum, in mensuris illis relationibus, *Gentle-  
mans Magazin* dictis, Anni 1764. mense . . .  
hoc titulo: Account of a Pamphlet, entitled,  
Short Observation etc. by an impartial Enquirer.  
Rectissime ibi laudatur illa ab Auctore ipso, de  
libello suo data recensio, vt recensori, vel com-  
pilatori extraneo labor leuetur, et vt hac ratione  
fideliter omne contentum libri exponatur, quin  
oscitantiae praecaueatur, ne ex hac natus peruer-



sus sensus Publico communicetur, vel omnimodo iniqua detur recensio: non enim haec adeo Auctoris ferit famam, quam Bibliopolae impensas, et Publici confidentiam delusam.

§. 2. Mira discrepantia Auctorum, de causa et therapia huius febris.

§. 3. Ideo numerum audacter auxi.

### Cap. I.

#### *De vesiculis miliaribus absque febre.*

§. 1. In harum censum numero vesiculas illas crystallinas infantum neonatorum, *Flos cutis*, appellatas, dum nullo symptoinate febrili adfecti deprehenduntur. Quae insequuntur has vesiculas eminentiae nerueae, comedones adpellatae, et sub vermiculorum forma apud *Ettmüllerum* pictae, et

§. 2. Ob pruritus, melle, fecibus cereuisiae, fuligine elicitaе, et nouacula amputatae, sub vesiculis istis, seu flore cutis sunt enatae.

§. 3. Pictorum fallax, arbitraria manus in pingendis rebus naturalibus, per exempla ex *Actis Nat. Cur.* et ex *Collect. Vratislav.* affertur.

§. 4. Quae melle etc. extricantur corpuscula nigra, difformia, crinibus minusculis hirsuta, vermiculis tota sunt dissimilia.



§. 5. Excretio miliaris nascitur ex nervis per balneum a muco liberatis, succum suum in miliares vesiculas exhalantibus.

§. 6. Sub hac excretionem systema nervosum grauitur interdum afficitur, cum tetano oris.

§. 7. Vesiculae miliares in manu, ex applicato magmate saponaceo.

§. 8. In fronte, ex emplastro de Tacamahaca.

§. 9. In femina nephritica, cum dolore ischiadico.

§. 10. 11. In femina, post abortum trigeminorum, cui, morbo exantlato, eminentiae, comedonibus, et crinonibus infantum similes, in brachiis aderant.

§. 12. Ex Eph. Nat. Cur. Vol. X. allegatur Matrona, in qua, post milia, et mortem, apices nigrae, non secus, ac puluere pyrio accensae apparuerunt.

§. 13. Saepius talia accidere possunt, si inquireretur.

§. 14. Purpura rubra, absque febre, feminae tenerae per saltationem excitata.

§. 15. Milia ope fumi succini ad methodum Medicorum Polonorum extricata.

§. 16. Febris miliaris, purpura alba diuiditur in idiopathicam et symptomaticam, ideo puerperarum aperte symptomatica primo exhibetur.

## CAP. II.

§. 1. Locatur primo mater illa trigeminorum per abortum.

§. 2. Puerpera in quinto puerperio illis laborans, cum grauibus hysteriis symptomatibus, sanata.

§. 3. Primipera, post varia symptomata, in primis frigoris interni sensum, mortua.

§. 4. Puerpera, cui post molestam vesicae exonerationem, reiecto regimine diaphoretico, sub frigidiusculo aëre, regimen diureticum adhibetur, et aëgra, spatio viginti quatuor horarum, octodecim mensuras aquae frigidae bibit, et reddidit; miliis frictione succinata, et lotionem cum aqua calida elicitis. Iudaeis solennis dicitur morbus.

§. 5. Puerpera, eadem fere methodo curata, cum tumore in hypochondrio.

§. 6. Puerpera diaphoreticis tractata, et antihysteriis, ab admissione aëris mortua.

§. 7. Puerpera conuulsione vniuersali correpta, scarificationibus, aliisque mediis post biduum euigilata, tandem conualescens, sphacelata in natibus.

§. 8. Puerpera ad methodum sudoriferam, cum multis antihysteriis, e. g. succo stercoris equini tractata, conualuit.



§. 9. Primipara miliis copiosissime, ad extremitates digitorum vsque laborans, obiit. Additur ex *Pelargo* similis casus, in femina, non puerpera, ab oneris gestatione ortus.

§. 10. Puerpera simul paralyfi crurum laborans, diaphoreticis, antihystericis, et vesicatoriis curata.

§. 11. Puerpera valde delirans, antihystericis curata.

## CAP. III.

§. 1. Adolescenti ex iracundia tetanus oris, eum insequentibus miliis. Morbus variis motibus conuulsivis interpolatus, sex septimanas durans, insequente sanitate.

§. 2. 3. Duo pueri a terrore mox febre miliari occupantur.

§. 4. Adolescens, febre miliari, cum stupore, quasi hysterico laborans, obiit.

§. 5. Virgo quindecim annorum, cum miliis delirans, et leuiter conuulsa, vsu opiatorum, et neruinorum conualescens.

§. 6. Vir triginta sex annorum, miliis cum phrenitide laborans, venasectionibus, et purgationibus tractatus, obiit. Totum corpus repletum est exsangue.

§. 7. Femina annorum triginta tres temperantibus, opiatibus; et camphora tractata, obit.

§. 8. Vir triginta sex annorum, delirio, se mortuum et sepeliundum poscens, conualuit. Idem casus de femina sine miliis.

§. 9. Milia feminae, circa trigesimum diem albescentia, cum veterino aegrae, tandem conualescentis.

§. 10. Vidua a febre miliari, post morbillizantem perpeſſam, correpta, subito obit.

§. 11. Quadragenariis post faciei Erysipelas, die morbi vigesimo secundo, a miliis corripitur: post purgationes antiphlogisticas, et infusa paregorica conualuit.

§. 12. Quadragenarius purpura pellucida laborans, nitrosis et laxantibus curatus obit.

§. 13. Vir annorum triginta quinque, paraplegia occupatur, a carie secundae colli vertebrae, unde in facie, et nucha, milia. Moritur.

§. 14. Viduae triginta quinque annorum, febre lenta hysterica laboranti milia educuntur frictione cum fumo succini, per integram horam, ter in die repetita, trium septimanarum spatio; conualuit.

§. 15. Vir triginta sex annorum cum arthritide miliis laborans, mutato indusio conualuit.



§. 16. Vir triginta annorum, ob luis venereae suspicionem salinationi subiectus, purpura alba afficitur, cum pulsu hypochondriaco - hysterico: in balneo bene lotus et frictus conualescit. Postea autocheir.

§. 17. Femina ex melancholia delirans, sudoriferis, et nitrosis tractata conualescit.

§. 18. Neonupta, a prima nocte delirans, ridens, purpura rubra et alba afficitur. Per diapnoica conualuit.

§. 19. Femina, nona septimana a partu, denovo concipiens, purpura alba afficitur, cum narium haemorrhagia, diarrhaea, et diabete: conualuit.

§. 20. Pleuritis cum purpura alba.

§. 21. Inflammatio intestinorum c. purpura alba.

#### CAP. IV.

De natura febris miliaris ex symptomatibus eruta. Symptomata hypochondriaco - hysterica sunt considerata; nam ex stagnatione sanguinis in visceribus hypochondriacis facile exanthemata in superficie corporis producantur, quod in casu probatur. Separatim. Anxietates, pectoris oppressiones, aestus volatici, pulsus sub hypochondriis, suffocatio, stupor comatosus, vigiliae, sursurus aurium, delirium, motus convulsiui, viscidum in faucibus, magna debilitas, sudor effusus, lypo-

lypothymiae, frigus externum et internum, urinae paritas, et excretio gelatinosa.

§. 12. Cur purpura alba se associet arthritidi.

§. 13. Cur puerperis.

§. 14. Cur post exantlatas alias febres.

§. 15. De miliorum retrogressionem.

§. 16. De facie miliis laborantium.

§. 17. Tetanus oris, cum aspredine, miliis, largo opii usu curatus.

§. 18. Ex supra dictis statuitur I. praesens intemperies succi neruei, vel humorum vaginalium neruorum, domestica, vel II. per alias causas, e. g. per animi commotiones excitata. III. Plexus mesenterici concursus.

§. 19. Auctoritas adiicitur ex Eph. Nat. Cur. D. III. A. 7. 8. Obs. 206.

§. 20. De causis procatarteticis: allegantur Lindnerus et Hamilton, Indos hac febre laborare asserens. Causa in aëris constitutione.

§. 21. Definitio: *Milia vesicularia, purpura alba dicta, sunt neruorum excretiones halituosae, quibus, si spasmus febrilis adest, vel ex domestica corporis causa, vel ex animi pathemate, vel ex aëre succum neruorum alterante, sanguinem in visceribus coaugmentans, et primario plexum mesenterii*



*terii in tumultum agens, adeo, ut his, in consensum actis, parvis vagi nervorum amulo, ad praecordia, anxietates, vigiliae, deliria, convulsiones, aestus, volatici, sudores, et reliqua hypochondriacis et hystericis solennia symptomata generentur; pro dato nervorum robore, facile, vel difficulter sanabilia; quin, in posteriori casu, saepe in apoplexiam, vel in partium nobiliorum, vel in ipsorum nervorum visibilem, aut invisibilem necrosin, cum morte, aliquando in sanitatem terminantia.*

§. 22. Conclusio ad Therapiam: 1) spasmi febrilem sopire; 2) vires vitae fulcire; 3) excitationis periphericae non primariam habere rationem. De methodo lotrice cum frigida adiicitur.

## CAP. V.

§. 1. 2. 3. Consideratio primae indicationis: ante usum antispasmodicorum, laxans, et pro re nata, vomitorium, cum cautione.

§. 4. Nerui placandi pilulis ex castoreo, asafoet. moscho, aloë, primo biduo.

§. 5. Oppressionibus pectoris frictio cum fumo succini. Usus infusi cascarillae et rad. valerianae, spiritus bezoard. Bussi et castorei. Piedro del Porco usus vanus. Admittitur potus feri lactis vario modo parati, frigidi, a spasmo mesenterico

terico liberis intestinis. Psychrolucia repro-  
batur. Anittuntur clysteres frigiduli.

§. 6. Venaesectio admissa, licet contradicat  
*Home in Medical facts* Hirudinum applicatio.

§. 7 Ad secundam indicationem vires fulci-  
antur, otu frigidulo vini, feri lactis, et omnis  
potuleti. Praesente adpetitu, panis sapidus,  
pomaragrantia, parcum carnis vitulinae affatae,  
succentaе, cum brodio acidulo, iuscula car-  
niuntenuia, pinguedine carentia acidula come-  
dantur. Potus qualis. Serum lactis quale. Fra-  
gratia, suauia, male odora, vtpote neruina etc.  
Fritiones *Ranchiniana* topica, in tractatus de  
Saiio Praefamine notata.

§. 8. Tertiae indicationi qualis ratio habenda.  
Medicorum Polonorum nimium habita ratio.  
Psychrolusia notatur.

§. 9. Ad symptomata fit accessus, et quidem  
quid agendum: 1) Praesentibus pectoris oppres-  
sionibus; 2) faucibus strangulantibus; 3) lypo-  
thymiis ingruentibus; 4) vigiliis vrgentibus;  
5) arteriis in cordis scrobiculo pulsantibus; 6) de-  
liriis furientibus; 7) conuulsionibus vagantibus.  
De vsu interno sacchari saturni; 8) comatoso  
stupore accedente; 9) excretionе gelatinosa prae-  
sente; 10) sudore effuso vrente; 11) vrina parca;  
12) diarrhaea incidente; 13) frigore interno per-  
cellente; 14) lochiorum irregulari fluxu. De  
potu Caffee in puerperio.



§. 10. De negligenda purpura alba. De methodo sudorifera. De opinione vulgi, circa naturam purpurae miliaris.

§. 11. Febris miliaris non negligenter tractanda.

§. 12. Crisis purpurae albae.

## CAP. VI.

### *De Prognosi.*

Vesiculae miliares absque febre sunt absque periculo. Idiopathica febris, periculosa. Symptomata cum miliis copiosis, morbum dant gravem. Cum typo febris intermittens insidiosa. Prognosis circa anxietates: Circa sudorem cum pulsu exili; genarum circa ruborem; mucum narium; urinam; circa cutem; fauces; stuporem comatosum; subita Halcyonia; circa faciem aegri; convulsiones; ventrem rugientem; deliquia animi; vigilias; diarrhaeam; frigus internum, et ad crura; circa vomitum. Quoad Puerperas. Vetulis minus periculosa: ex Collect. Vratislav. et Tract. de Senio, Erfordiae, 1760.

## CAP. VII.

### *De Praeservatione.*

- 1) Certa methodus praeservandi non datur.
- 2) Puerperae vix iuste accusatae. Consilium Puerperis, septuplex. Reliquis compendiosum.

*Additamentum* ex Illustri Fordyce, Medico Anglo, nempe eius Tractatu de Historia febris miliaris, Londini, 1758 edito. Queritur, quod negetur febris miliaris, similis in hoc *Hamiltono*. Pag. 3. febris magnopere epidemica. Pag. 4. de Natalibus huius febris; cum adiecto ratiocinio circa ortum nouorum morborum. Pag. 18. de causa huius febris. Interiectis variis dubiis et ratiociniis.

Aphorismorum Fordycianorum, numero 162 amica perlustratio.







## CAPVT I.

### *De vesiculis miliaribus absque febre.*

#### §. I.

**P**ercognitum est, infantibus recens natis, mox a natiuitatis die, exsurgere in cute myriades vesicularum crystallinarum, quas mulieres cutis adpellant florem, quibuscum infantes plerumque quieti deprehenduntur, nec, ex hoc exanthemate, villo febrili symptomate afficiuntur. Interim bene considerandum, has vesiculas, in plerisque infantibus, mox eminentias quasdam pilosas, nerveas insequi, in dorso maxime reperibiles, quas Comedones vocant, et quas, sub vermiculorum horrendorum, generique nondum vlli addictorum, formam, pictas dedit ETTMULLERVS, in Valetudinario infantili.

§. 2. Hae eminentiae, quando apparent, infantes valde inquietas reddunt, pruritus vehementem excitando; donec vel sponte exarescant, et extricentur, vel melle liquato, vel fecibus cereuissiae, vel, more Lusitanico, cum melle et fuligine, frictae, extirpentur, vel nouacula amputentur, palliative: quando autem iterata extricatio cum materia quadam mucilaginosa non insequitur, amputatio illa parui est leuaminis.

§. 3. Receptus vsus mellis, et pilorum horum elasticorum sub frictione calida, ad fornacem, vel in balneis, commotio, primo ideam de vermiculis generauit, et ideo non solum in figuram illorum inquisitum est microscopiis, sed et primariae partes animalculi, caput cum oculis inuentum, more Pictoribus solito, qui aequae facile figurae aliquid addunt, quam demunt. Quod ut probem, vide figuram Rapae anthropomorphae in Ephem. Nat. Cur. D. I. A. I. et Coll. Vratisl. A. 1725. mense Octob. alia de puella etiam regni vegetabilis.

§. 4. Quantus, variusque labor ad debellanda haec animalcula adhibitus fuerit olim, dum hi mercurialia in usum vocarunt, illi aloëtica, aliaque amara, vide apud ETTMULLERVM. Quae mihi oblata sunt, non vna vice, ex infantum cute, siue melle, siue fecibus mediantibus, extricata corpuscula nigra, difformia, crinibus minusculis hirsuta, magnitudine vix semen carui aequantia, minime illis vermiculis fuerunt similia, etiam microscopio conspecta.



§. 5. Allegat ibidem ETTMVLLERVS hanc excretionem miliarem infantum originem suam debere massae sanguineae, ex prima intensiore respiratione, fermentatione agitatae, ex qua feculentiae tales ad cutim extrudantur, et quidem occasione balneorum cum recens natis institutorum. Verum tales excretiones infantum, vnice ob diutinam macerationem papillarum nervearum periphericarum, in liquore, et mucovterinis, per balneum, ab his liberatorum, nunc relaxata epidermide, viuidum suum succum in miliares vesiculas exhalantium nasci, magis credibile est, exsiccante postea impune apicum nervorum substantia, vt secari, vel euelli possit.

§. 6. Notandum etiam, quod infantes, sub excretionem miliorum, apparenter non aegrotent, id quod, si excretionibus feculentis, cum ETTMVLLERO tribuas, absque febrili commotione sanguinis fieri non posset. Affici autem totum systema nervosum interdum grauitur, forsan Tetanus oris, pusillis, mox sub cursu hujus affectus miliaris superueniens, docet. Videbimus enim infra hunc grauem spasmus etiam adultos corripere, et huic morbo jungi.

§. 7. Praeter hanc spontaneam apparentiam vesiculas miliares aliquando apparebant in dorso manus viri, qui contra Scabiem magma quoddam ex lapatho acuto et sapone adhibuerat. Hoc magmate mediante papillae nerveae innumeras vesiculas miliares exhalauerant.

§ 8. Sic femina contra dolorem capitis emplastrum de Tacamahaca fronti applicauerat : ex quo tota frons pustulis miliaribus obserebatur.

§. 9. Femina quaedam obefior, nephritica, per biennium fere, a malo ischiadico, in femore sinistro vexabatur, et tandem lectum ob doloris vehementiam seruire cogeatur. Decoctum amaricans, cum lignis exoticis, dolorem parumper sopiebat. Exfurgebant autem mox anxietates hypochondriacae, cum vesiculis miliaribus, purpurea alba, vocatis, in femore dolente et abdomine, eiusdem affecti lateris. Accedebat tandem dolor podagricus, qui milia cum anxietatibus quasi resorbebat, unde omnia rursus tranquilla euadebant. Interim hae excretiones, spatium trium septimanarum contigerunt, absque febre quidem, sed semper comitantibus anxietatibus.

§. 10. Annumeranda nunc venit femina quaedam 25 annorum, quae tertio graviditatis mense, abortum trigeminorum patiebatur, quorum vnus totus sphacelatus, et niger erat, nullatenus tamen a sphacelo mollis vel foetidus: reliqui vero erant optimae conditionis. Secundinae perfecte secutae erant. Lochia pauca nunc fluebant, nunc cessabant. Accedebant autem dolores abdominis totum corpus interdum peruagantes, et ipsas scapulas lancinantes. Maxime molestae autem erant hypochondriorum inflationes, cum anxietatibus, et conjuncta brachiorum et dorsi formicatione, absque omni febricula, et febrili pulsu; nisi pulsus agitationem, praesentibus



bus anxietatibus, exceperis. Apparent autem die octavo, in brachiis a pruriente fornicatione antea valde vexatis, et simul in manibus, pustulae miliares. Remedia dantur, aluum leniter subducentia, aloëtica dosi parcissima, absorbentia, nitrosa, parce omnia, quia omnia sunt pacata. Sub his remediis transpiratio interdum sponte aucta erat, interdum nulla. Elapsis circiter quatuor diebus vesicularum fit desquamatio. Noctes tamen, sub pulsus statu naturali, sunt inquietae, et appetitus ad cibum deest. His non obstantibus, aegra ad negotia domestica redit, a dictis illis anxietatibus, et molestiis libera. Elapso autem sic vix quatrduo, nouae anxietates, noui dolores abdominis, excretionem lochialem molientes, cum fornicationibus brachiorum valde molestis, lectum repetere, et ibi solamen ex sudore benigno, cum noua excretionem vesicularum crystallinarum miliarium expectare rursus iubent. Apparent, obuiam itur iisdem praedictis remediis: mitigantur, et soluuntur rursus omnes hae molestiae, aegramque hac vice clementius dimittunt. Alacrior itaque nunc sua recapessit negotia. Verum vix elapso octiduo, eadem insurgit scena, et hac iterum, clementiore multum modo finita, aegra rursus, per octiduum, negotiis extra lectum vacat; donec quarta vice, solitis symptomatibus, leuissimis tamen, et absque dolorificis lochialibus excretionibus vexata, de lecto multum alacrior surgeret, et quidem sine omni insequente recidiua.

§. II. Durauerat hic interpolatus morbus per quinque septimanas, quibus elapsis, ecce, obseruantur in brachiis, nunc denudatis, in quibus dictae fornicationes immitius aegram vexauerant, eminentiae multae, totae nigrae, iis similes, quas in infantibus, post ita nuncupatum, cutis florem, et insequentem magnum pruritum, inquietudinem, et eiulatum, Comedones et Crinones appellare solemus; multum crassiores tamen, et, ut praecise loquar, lineam dimidiam crassae, et lineas tres, vel quatuor longae, absque doloris sensu, se facile euelli patientes. Illa eandem pars, quae extans cutim perforauerat, dura et nigra erat, vti Comedonum corpus, quae autem intra cutim adhuc haerebat, mollioris, nerueae erat substantiae, et albi coloris. Interpolatas itaque has spasmodicas crises, ex quacunque fuerint immediata causa, saluauisse integrum systema neruosum, per extremitatum corruptionem, maxime credibile est. Et, cur hoc credere non liceat? Quotidie enim cum partibus solidis neruos suppurasce, vel in siccum sphaelum abire videmus, absque totius systematis noxa. Quando autem ichoreseunt, tunc periculosior est illorum conditio, totum systema malignitate inficiens, et conuulsiones cum insequente morte alliciens.

§. 12. Licitum mihi sit ex Ephemer. Nat. Cur. Vol. X. Append. p. 10. casum allegare, rarum hoc phoenomenon dilucidantem, conformem. Matrona nobilis, 46 annorum, obesi

corpo-



corporis, a nocturno funere redux febriebat. An-  
 sam morbo dederant moeror, et foeda, quae e-  
 tumulo spirabant, effluuia: Fluxerant modo ante  
 menses; vires protinus destruebat cardiacus do-  
 lor atrox; nox inde vigil; amaror oris; mador  
 sine leuamine; vrina biliosa; sitis; algor cum fer-  
 vore alternus; mox sudor colliquatius; quarta  
 milii confluentis aderat copia. Huius pustulae  
 adeo confertim extuberabant, ut multiplicato or-  
 dine sibi invicem insiderent; turgebat illo igni-  
 torum tuberculorum agmine corporis ambitus;  
 splendebat fusco rubore torua facies; rugiebat  
 venter; vrgebat vesicae stimulus; repetebant  
 menses; artus rheumate torquebantur. Tali  
 praecipitati funeris apparatu circumuallata nostra,  
 quinta die anxia, quasi e vinculis se extricatura,  
 se voluebat, suspiriosa, lurida pallore marcida,  
 β&φθαλμος, aphona, stertens, subito expirans.  
*Vasorum cutaneorum apicibus, igne sacro, non  
 secus ac pulueris pyrii accensione destructis.* Si  
 pace tua licet, aeque Lector, haec verba ita in-  
 terpretarer: papillarum nervearum apicibus igne  
 sacro, non secus, ac pulueris pyrii accensione  
 (qui semper partes accensas denigrat) destructis.  
 Neruorum enim apices, papillas, in cute facilius  
 dari, quam vasorum, anastomosi sese excipien-  
 tium, in aprico est.

§. 13. Unica quidem mihi in Praxi ob-  
 uenit supra allegata femina, cum nigris neruo-  
 rum apicibus; forsan autem pluribus accidit.  
 Nulla huc usque suspicio denudationem inquisi-

toriam suavit. Si autem in adultis raro contingit; in infantibus res est quotidiana. Ex his sane inferre licebit, Crinones et Comedones infantum non esse mellifugos vermes, quales pinguntur in ETTMULLERI Valetudinario infantili, sed etiam apices nervorum, sub pustulis miliaribus infantum, flos cutis, dictis, emergentes. Conf. Nova Acta Physico-Medica, Tom. III. Observ. de natura febris miliaris, Comedonum et Crinonum infantum.

§. 14. Purpuram rubram, absque febre, saepe videas feminas teneras, per saltationes sibi procreare. Commotio vehemens sanguinis produxit orgasmum vascula sanguineha cutis extendentem, absque febre, et sic emerfit purpura artificialis.

§. 15. Haud inconuenienter forsitan allegabo violentam illam vesicularum miliarium, per fumum succini productionem, quae capite secundo, (§. 1.) dabitur. Adfuit quidem, praesente hac productione, febris, qui verò haec productio non a morbo, sed a manuali operatione facta est, illam hic locasse non incongruum fuisse puto.

§. 16. His praemissis, antequam progrediamur, febrem miliarem albam, purpuram albam, in Idiopathicam, et Symptomaticam distinguere lubet. Idiopathica audiet illa, quae immediate ex affectis nervis oritur, febre ipsa ex his affectis accensa. Symptomatica vero, in qua haec nervorum singularis affectio, alius causae febribus



febribus accedit. Cum jam febris Puerperarum miliaris apertissime symptomata sit, accedens nempe febris puerperis per se solenni, de febris miliari Puerperarum, in sequente capite, primo, et separatim agemus.

§. 17. Equidem non omnes, quos adducam casus, meae sunt experientiae; illos autem ex variis Scriptoribus proferam, ex quibus indagata naturam Purpurae albae feliciter cognoscere licebit.



## CAPVT II.

### *De febre miliari, seu de purpura alba Puerperarum.*

#### §. I.

**I**n capite praecedente febrim puerperae, post abortum trigeminorum, miliarem, ad illas retuli, in quibus milia alba, pellucida et crystallina, absque febre conspiciuntur, quia illa, omnimode aequiuoca, et saepius cum euphoria interpolata fuerat. Nunc autem in puerperas, hac symptomata febre grauitate laborantes inquirere iuuat. Ex recensione enim status illarum praecedentis grauiditatis, et ex symptomatibus febrim comitantibus, facile natura et causa febris huius deleteria detegatur.

§. 2. Puerpera annorum 35, temperamenti viuidi, sanguinei, habitus tamen teneri, in quinto puerperio, in quod, per grauiditatem, multo aestu volatico, pedum oedemate, multisque aliis molestiis stipatam, excluso feliciter grandiore foetu, peruenerat, fluentibus copiose lochiis, tertio die in eadem incidit lypothymias, quas mox a partu, cum a sella, in qua aluum deposuerat, ad lectum properaret, perpeffa erat. Reuocata, per varia excitantia, anima, et deuolutis, consueta encheiresi, cum mesenterio insurgentibus intestinis (vtero, ad vulgi sensum) vires, ex parcissimo haustu vini rhenani, aromatizzati, et saccharati, recipit. Datum vsualiter ad eundem scopum, castoreum, et Liquorem C. C. succin. respuit. Post vini haustum ructus explodit innumeros, aegram valde leuantes: cum e contra a dictis medicamentis ardorem et faucium siccitatem sentiret, idque eo magis, cum iam renisum aliquem in deglutitione, hysteriis solennem obseruaret. Quae iam tertio die puerperii aegram afficiebat febris, nunc die quarto illam magis afficiebat, cum multa iectigatione, et dolore in vtero, non obstante debito lochiorum fluxu. Nihilo minus ex tumore quodam in osse sacro suspicio de stagnatione sanguinis circa vasa vteri nascebatur, et datis remediis antifebrilibus, nitratis, clyster ex herbis emollientibus, cum oleo lini, absque sale, parabatur, et intuitu resoluendae stagnationis, decocti clysmatici, vnciiis novem drachma una et semis spiritus vini gallici admiscebatur. Euocabat quidem hoc clyfina



clyfina copiofas feces, fed tantilla fpiritus vini quantitas, ardores inteftinorum, et quidem faluo inteftino recto, et maiorem linguae et faucium ariduram creabat, cum magna tamen remiffione tumoris in offe facro, et vteri doloris. Die quinto noui infurgebant aestus volatici, anxietates, iectigationes, et vigiliae, cum valde moleftis brachiorum ardoribus, et licet aegra aluum fecunda vice deponeret, nulla tamen inde horum incommodorum remiffio, donec lactis vnciae octo, cum drachma nitri in anum iniicerentur, vnde turbarum harum fpasmodicarum finis. Die sexto idem clyfter iniiciebatur, addita herba chamomillae; ex quo cum paucis fecibus, febris, et anxietatum magna remiffio. Hinc die feptimo ftatus aegrae tranquillior. Praeter Thee nigrum, omnem alium potum auerfabatur; bibebat autem frigidulum, moderatis hauftribus. Die octauo, aluus, verius vefperam fponte foluebatur fpumida, cum multorum flatuum, ex reftituto tono, explofione; vnde nox fomnifera. Die nono, de molefto gutturis fenfu querebatur, quem illinitio externa cum oleo carui deftillato leuabat. Vfus folennium remediorum febrifugorum, ob aegrae auerfationem huc ufque parcus fuerat; et fic transibant, dies decimus, vndecimus et duodecimus, nifi, quod in his, et in praecedentibus, aegra languida, in iufculo vini lymphati folamen quareret, et inueniret; quin fub initio huius vſus, hunc adhuc de illo fructum frui depraedicaret, quod exinde viſum a puerperio debilitatum, adeo fortioſorem reciperet, vt, cum antea lucem nullatenus

tenus ferre potuerit, nunc illam comode ferat: taceo, quod lochia alba, interdum remorantia, semper ex usu iusculi vinosi melius fluxerint. Die decimo tertio tandem praeter consuetos ardores volaticos brachiorum, peculiarem quandam pruritum in sterno, et in mammis sentiebat, et cum haec regio inspiceretur, purpura alba, pellucida, ibi reperiiebatur. Eruperat nempe hoc exanthema, sub his halcyoniis, et sub lochiis copiosis. Diem morbi decimum quartum nox praecesserat inquieta, anxia, cum ardoribus volaticis, maxime in brachiis. Applicabatur clyster lacteus, unde duae sedes. Milia in pectore copiosiora. Aegra quotidie mutat lectum, in recalcitratum autem redit. Thee bibit, mox calidum, mox frigidum, pro naturae nutu. Sudor parcissimus, vel nullus. Extra aestuum volaticorum momenta, brachia sunt frigida. Aegra, mox totius corporis, et manuum, quin faciei cooptationem, sub immobili quiete corporis, sibi commodam facit, mox simul et semel adeo vritur, ut manus et faciem subito detegat, et auram admittat. Lochia alba rursus parca. Interim sub repetitis aestibus volaticis novae miliares pustulae. Die decimo quinto mox quieta quidem, sed fere insomnis. Petit iusculum vinosum; ex dato analepsis, ructuum explosio, et ad somnum inclinatio. Die decimo sexto, nox praecedens somnifera, aegraque ab aestu fere libera, cum pulsu rythmi naturalis. Pustulae miliares turbidae fiunt, desquamantur, nec novae succedunt. Die decimo septimo de debilitate queritur, et  
linguae



linguae siccitate, comite leuiore aestu, et quadam pulsus agitatione. Die decimo octavo parcitas somni, et eodem debilitas. Die decimo nono iusculum sibi ex lacte parari facit, fert etiam ad panem butyraceum adpetitus, quibus comestis, post trihorium circiter, graues hypochondrii vtriusque tensiones, et post horulam, graues lypothymiae, hystericae dictae. Intestinorum, et mesenterii nerui, ante per iuscula vinosa roborati, ex his mucilaginosi in atoniam relapsierant. Nullae autem sequebantur nouae anxietates, nec miliares pustulae. Restabat tamen, in corpore tenero, per graviditatis molestias, partum, et morbum grauem superatum, emaciato, febricula lenta, quam Phthisis cum tusse, et tandem vomica suppurata insequebatur: et, vix elapso biennio, mors.

§. 3. Puerpera primipera, quae tempore grauiditatis adpetitui ad varia edulia indulserat, durante puerperio, dorsi, colicisque doloribus fit obnoxia, et non, nisi ex pilulis Becch. aluum deponit. Die decimo septimo lectum relinquit, se bene valentem habens, lochiis simul adhuc fluentibus. Panem edit crocatum, butyro grauidum, et haud longe post terrore afficitur. Sequuntur mox cardialgiae, vomitus, sudor frigidus, pulsus paruus, celerrimus, ructusque singultuosi. Applicantur clysteres sex, successiue emollientes, quin irritantes absque fructu. Postea ex pilulis Becch. repetitis, aluus soluitur fluida, spatio 36 horarum, decies. Cessant vomitus, perstant ructus singultuosi. Somnus sequitur

quitur turbulentus. Tercio die adpetit cereui-  
siam coctam, addito pane, illamque bene fert.  
Pulsus tamen est febrilis, celerrimus, debilissi-  
mus, myurus. Frigent extrema, absque ardore  
interno. Dolet hypochondrium sinistrum. Ve-  
speri adhuc sedes liquidae, oleosae, a clystere ta-  
les, et tantem feces solidae, cum flatibus, huc  
vsque praeclusis, et ex nunc ructuum cessatio.  
Non enim amplius infarcta erant, sub hypochon-  
driis intestina. Contra dolores abdominis, et  
ad oeconomiae corporis placidae reductionem  
dantur inter alia diapnoica, Theriacaе cael. gr. i.  
cum Laud. op. tertia parte grani. Nox inde pla-  
cida, pulsus plenior, et ad rythmum naturalem  
paululum redeunt: manus pedesque calidi. In  
collo autem miliares pustulae, licet non copio-  
sae, die quarto apparebant. Hae die quinto di-  
sparebant. Die sexto copia redibant. Aluus ex  
sex pilulis Becch. per totum diem diarrhaeodes,  
quae, ob lochia retenta, non tenebatur noxia.  
Comites autem erant somnus parcus, manus fri-  
gidae, pulsus debilis: sudor nullus, vrina nulla,  
flatus nulli. Remedio sunt aquae carminatiuae  
cum essent: corticum aurant. interposito nitro.  
Versus noctem autem praedictus pulvis ex Ther.  
caelest. absque, hac vice, somno insequente. Die  
septimo frigus internum accusat, et superficiei  
corporis ardorem. Datur pulvis ex gr. x. cort.  
peruv. et cascar. gr. v. cum tertia parte grani  
laudani opiati. Quieta quae ante horum pulue-  
rum vsum aegra, post duos pulveres, trihorio  
sumtos, caput sibi grauari dicebat. Dantur spir.  
Bez.



Bez. Ruffi gtt. 20 et ex his, bis datis, pulsus plenior, et aegrae declaratio sibi melius esse. Albescent milia confestim. Nox diei octavi tranquilla fuit, et somnifera. Queritur tamen de dolore in ileo sinistro, ideo clyster carminativus iniicitur, animatur duabus drachmis eff. alexiph. Stahlii, c. doloris sopitione. Quinque pilulae Becch. horas septem ante clyisma datae duas dabant simul sedes. Lochia sunt parvissima. Pulsus plenior, semper tamen febrilis. Aegra nihilo minus animi est hilaris. Versus noctem autem frigoris interni sensus, a capite ad calcem, et exteriorum calor auctus. Caput maxime a frigore afficitur. Alternant frigus et calor: major tamen est frigoris sensus, dum loquitur, et corpus vel minimum mouet. Die nono se bene dormiuisse dicit. Dantur sper. bez. Ruffi guttae 5. repetitis dosibus. Ex iusculo gallinaceo prandium, cum suspecto tamen, et dubio appetitu, capit. Aluus bis vel ter sponte soluitur. Versus noctem sensus frigoris interni mitior, ipsaque nox tranquilla, insomnis tamen. Die decimo, mane, magnus frigoris interni sensus. Ad hunc fugandum pulveri, ex cort. peruv. et cascar. addebatur ol. cinamomi gutta vnica; sed maior inde frigoris in capite sensus, cum pulsatione. Post bihorium, delirium, conatus vomendi, stupor apoplecticus, et, elapsa hora, mors.

§. 4. Femina 26 annorum, tenerioris habitus, tempore grauiditatis consuetam omiserat venaesectionem. Quarto a partu die lochia subsistunt,

sistunt, et anxietates praecordiorum, cum aestu et frigore alternantes, vigiliaeque cum febre, et siti inexplebili exoriuntur. Purpura praedicatur. Ideo aluus, quae in primo puerperii triduo, pilulis Stahlianis sollicitabatur, nunc clysmate soluitur. Datur infusum diapnoicum Theiforme, et sp. nitri dulcis cum quarta parte spir. bez. Buffi. Adparuit purpura die quarto. Disparuit autem mox, et exinde maior respirandi difficultas, cum animi deliquiis. Accedit tensio quaedam in regione lumbari et melessa vesicae exoneratio. Quid consilii? regimen diaphoreticum reiicitur, stragulorum pondus remouetur, et aër frigidiusculus in conclaue admittitur, simulque potus ex decocto auenaceo, C. C. nitro, et melle frigidum sumendum datur, et quidem omni bihorio. Scopo diuretico autem crem. tartari scrup. vnus, cum salis tartari scrup. dimidio propinatur; et quo hic scopus eo melius obtineatur, regioni vesicae et renum, vesicae bubulae, oleo et lacte semiplenae imponuntur. His subsidiis spatio 24 horarum, aegra octodecim mensuras aquae frigidae bibere coacta fuit, quae vix a ventriculo exceptae, albae per vrinam redditae sunt, et pellucidae, absque sedimento, insequentibus in vitri parietibus spiculis salinis, sine dubio ex cremore tartari natis. Durante diuresi pectus non solum fumo succini frictum, sed et aqua calida saepius lotum fuit; quibus rebus sudor placidus per vniuersum corpus successit. Hinc septimo morbi die corpus vesiculis minimis totum fuit consitum. Adhibitis, per biduum pulueribus ex antim. diaph. et nitro, anxietates, et  
phlo-



phlogoses sublatae sunt, et aegra conualuit. Fatetur quidem Auctor, in *Primitiis Med. Pol.* Vol. II. p. 219. aegros quosdam hac methodo periisse, et illorum accusat laxiorem texturam. Itaque, quia haec febris maxime subiecta laxioris texturae infestat, haec methodus omnibus secura non erit. Cumque addat, Iudaeos hoc morbo plurimum laborare, certe et illi, ex nativa constitutione, vel lege regiminis vitae, laxioris habitus homines sunt censendi.

§. 5. Femina 24 annorum, tenerioris constitutionis, secunda vice puerpera, primo et secundo die, vti fere omnes solent, bene valet. Ingruens tertio die spirandi difficultas, aestusque, cum magna debilitate, periculum indicant. Hypochondrium sinistrum tumidum est, eodem in loco, quo tempore grauiditatis ponderis sensum molestum habuerat aegra. De sanguine coagulato, et accumulato nascitur suspicio: ideo cataplasma ex herbis emollientibus, vino rubro incoctis applicatur, simulque dosis pilularum Stahlī propinatur. Subsident inde tumor, sed mox in regione pubis pondus sentitur, quae itaque eodem cataplasmate fouetur; interne autem myrrha, cum variis extractis amaris, lixiuioso menstruo solutis, datur. Die quarto et quinto lochia copiosa, cum omnium symptomatum leuamine, et excretionē sanguinis ichorosi, foetidi. Septimo die pustulae miliares sparsim efflorescunt: calor vero, et imi ventris spasticae contractiones persistunt. Iniicitur itaque die octauo rursus clyma.

Die decimo tandem vesiculae plures, in collo et pectore: anxietates praecordiorum, capitisque dolores mitiores. Die vndecimo omnia bene. Die duodecimo lochiorum stasis, et omnia priora mala: nulla, neque ex diureticis, neque ex diluentibus melioratio. Animi deliquia, cum summa debilitate. Vesicatoria pedibus applicantur. Fricatur pectus cum panno laneo, succini fumo imbuto, et aqua calida lauatur. Redit tandem lochiorum fluxus, et purpura denuo efflorescit. Die decimo quarto aegra a frigore corripitur totum corpus per duas horas concutiente. Inquietudines summae, pectorisque oppressiones. Pulsus debilis, contractus. Sitis inexplebilis, sudorque frigidus copiosus. Dolor in vagina vteri acutissimus. Vestigia purpurae nulla. Actum esse de aegra putatur. Interim aegrae, leuamen poscenti suadetur potus aquae frigidissimae, cuius mensurae dimidium, omni horae quadrante exhaurit, et quidem per integras quatuor horas. Vteri dolorem linteo aqua frigida grauido, et externe applicato sopire tentatur: interne autem potio ex aquae melissae et serpilli vnciis quatuor, cerussae antim. nitri depur. drachmis duabus, et aliquid spiritus nitri dulcis, cum aceto destillato datur. Porro pulv. bezcard. cum camphorae grano, in aqua frigida aliquoties exhibetur. Iam quinque elapsis horis, frigus, sitis inexplebilis, et vteri dolor cessabant, et misera profundo oppressa somno, per sex horas placide obdormiebat, quo tempore ex vtero magna copia ichoris bruni, odoris



odoris foetidissimi effluxit. Vires paulatim cum sanitate redierunt. Ex Prim. Med. Pol. Vol. II.

§. 6. Femina quaedam ante partum dolore colico, spasmodico neruorum, et spirituum defectu laborans, ipsum partum infelicem habet; foetu exempto, ob spirituum defectum mox mors metuebatur. Medicus autem animum aegrae erigens, febrem miliarem praedixit. Dantur itaque ad lenem diaphoresin puluis e chelis cancrorum, et castorei gr. v. ex bolo. Adsunt simul pectoris oppressiones, cum pulsu frequenti et debili. Calor vniuersus absque alterno frigore. Vrina sanorum similis. Aluus bis soluta, hinc a colica libera. Ne autem exinde lochia minuerentur, castorei gr. v. asae foet. gr. xii. Laud. Londinensis gr. i. in pilulis, quauis quarta hora, ad dosin duarum pilularum sumendis, dantur. Die tertio idem status, nisi quod cor leuiter palpiter. Eadem iussa sunt medicamenta, additum tamen fuit sal volat. ol. guttis 20 in languoribus, ex aqua ceraforum, et cinamomi sumendum. Die quarto pustulae miliares adsunt, et spirituum minor defectus, suspiria etiam minora. Lochia recte fluunt, et aluus mediocriter soluitur. Sumantur itaque pilulae absque Laudano, sexta quauis hora. Ob timorem adstantium, ex diarrhaea mortem timentium, confect. Fracast. drachma vna ex aqua menthae, et aqua epidem. praescribitur. Die quinto vsus huius medicam. contra medici voluntatem fit copiosus; hinc primo feces inspissatae, mox autem tota diarrhaea sublata: inde palpitatio, et oppressio

cordis maiores; ergo croci gr. x. et tinct. croci guttae xx. ex aqua lactis dantur: porro pilulae supra dictae, sine Laudano, et Iulapium ex aqua cerasorum. Interim matris iussu diascordii usus fit perpetuus. Aegra percontatur alium medicum, an liceat ventilabro uti, se ex lecto erigere, cortinasque lecti remouere? annuit. Verum, postea aegra confitetur, se spirituum defectum, et pectoris oppressiones exinde sensisse. Nihilominus continuat aërem libere admittere, vnde non solum miliorum occultatio, sed et materiae morbidae in cerebrum delatio, ex qua aegra, mox sensibus orbata, obiit. Hamilt. Hist. V.

§. 7. Puerpera 38 annorum, ipsa natura, et nunc ex sexto partu, debilis, eosdem, quos sub grauiditate passa erat dolores, adhuc dum patitur, cum calore et frigore alternos, pectoris oppressione, et spirituum languore. Amicae hos tumultus Vapores appellant, simul in die baptismi copiose confluentes, spiritus aegrae iam debiles magis perturbant, et hoc modo tremores et motus conuulsuos in aegra excitant, ut difficulter in lecto potuerit detineri, donec conuulsione vniuersali correpta, mortuae similis in languorem caderet. In speculo, naribus, et ori, admoto, nullum respirationis signum, et in facie pallida mortis imago. Prohibentur tamen stragulorum remotiones et cogitationes de ordinatione sepulturae: applicantur cucurbitulae, cum scarificatione inter scapulas, et internis femoribus; pone aures autem et in carpis, vesicatoria. Tempora, et  
volae



volae manuum, pedumque plantae, oleo succini illinuntur. Naribus sternutatoria, et ori, pro possibili, castoreata induntur. Scarificatio tamen inter scapulas, ob corporis rigorem, vix fuit applicabilis. Biduo elapso, primo recalescere, mox mollissime respirare, et tandem deglutire cepit. Applicantur tunc vesicatoria inter scapulas, et propinantur guttae 20 falis vol. ol. Die tertio aegra loquitur, et se mouet: pustulae copiosissime etiam apparent. Die quarto maiores fiunt, cum mentis plenario reditu, nec pectoris oppressio adest, nec languor; sola imbecillitas restat. Datur pulvis e chelis cancr. ex aqua lactis alexit, et sic porro ex datis stomachicis amaris, paulatim conuuluit, licet, durante morbo sphacelationem innate passa fuerat. Hamilt. Hist. vi.

§. 8. Puerpera in parturitione valde debilis, post partum pectoris oppressione, spirituum defectu, et suspiriis laborabat. Hystericos vapores haec interpretabantur adstantes. Interim denudatio mammarum, et alui relaxatio occasionem dedit spiritus angustiae, et respirationi difficili conuulsiuae, cum graui tussi, vt mortem timerent. Pulsus erat frequens, et debilis; coniunctae vigiliae; vrina pallida; lochia suppressa. Pustulae miliares ex dicta denudatione paucissimae. Ad methodum consuetam iudoriferam itaque confugere necesse erat. Ergo, recipe Sperm. Ceti scr. i. Bez. or. Croci ana scr. semis, Syr. hed. terr. q. s. pro Bolo; et ad aegrae, et illius amicorum bene placitum, qui hanc febrem

hystericum affectum esse aestimarunt, simulque, vt lochia pellerentur, recip. Castorei gr. 6. asae foet. gr. 12. syr. poeon. q. s. pro pilul. 6. Sequentie die optime se habebat, (idque pro Medici sententia) ex Bolo. Respiratio leuior, lochiorum fluxus melior, vrina coloratior, pustulae mil. in pectore plures. Repetitur itaque Bolus, addendo grana aliquot pulueris de gutteta, ne asthma recurrat. Umbilico Empl. de Tacamah. et plantis pedum suppedalia ex pice et euphorbio. Contra languores autem lulapium perlatum, et aqua the-riac. Inde vesperi sudor et respiratio faciliores: pustulae miliares densiores, spirituum minor defectus. Continuuntur itaque Boli, et *pro re nata, sumatur succus equinus ex fimo expressus in aqua card. ben. vt lochiorum fluxus, volatilibus fimi particulis excitaretur.* Nox insequens placida quidem, sed de die respiratio conuulsiua, ideo recipe aquae lact. alex. vnc. 3. Syr. caryoph. lact. epid. ana drach. 2. Lap. de Goa, de Guttet. scr. f. pro haustu, et post sex horas sumat Bolum nuperum, et pilulas 2 intermedio tempore. Ex his vesperi sudor vniuersalis, pustularum intumescencia, et asthma diminutum. Contra flatus autem valde molestos, saccharo instillantur ol. aurant. guttae tres, sumendae ad libitum (*Idem antihystericum, sed suauius et lenius, quam asa foet. et sterqus equinum, licet hic intuitu lochiorum datum, ob negatam praesentiam pass. hystericæ.*) Sequenti die omnia meliora: hunc tamen insequente, ex intermisso sudore, ventriculi aegritudo, et mentis confusio deliriosa. Restituatur sudor



dor per haustum praescriptum, addito Bez. or. et posseto saluiato, et empl. suppedal. Ex his pustulae rubrae miliaribus interspersae accesserunt; post quarum excretionem plures medici in auxilium vocati sunt, qui pustulas has rubras a sudore tantum factas esse, cum risu dictitarunt. (*Sint ex quacunque causa natae, bonum tamen successum excretioni miliarum dedisse videntur.*) Die insequente pustularum miliarum desiccatio, et ad sanitatem bonus progressus. Hamilt. Hist. VII.

§. 9. Primipara 18 annorum, tempore graviditatis freta proverbio, grauidis peccata diaetetica, absque insequente noxa, permessa esse, mox a partu vomit, id quod tamen, a iusculo, ex carne parato, euenisse putat. Lochia subsistunt. Nox sequitur inquieta, sitis intolerabilis, pulsus vehementer febrilis, calor corporis vrent, brachia, pectus, et scapulae miliis multis obsitae. Dantur alexipharmaca temperata, et quae lochia promouere solent, sed incassum omnia. Sequitur delirium, et vesiculae, seu hydatides crystallinae, per totum corpus, extremitatibus digitorum manuum pedumque, copiosissime, et racematim adhaerentes excernuntur, ut ne locus esset, qui cuspidi acus cederet. Et licet delirium tandem cessaret, tamen omnes actiones animales et vitales, cum vita pedetentim euanescebant. (MENZELIUS in Ephem. Nat. Cur. D. III. A. 9. Obs. 184. simul declarans, tale quid in Praxi sua non vidisse nec legisse.)

Certe, adeo enormiter copiosas vesiculas in hac febre exanthematica videre, rarum est; et robustis solum talis copia aliquando non lethalis est, uti in sequenti capite videbimus. Interim et *Pelargus*, in suis *Observ. Clinicis*, anni 1722. allegat feminam, cui post insolitum motum corporis, sub oneris grauis gestatione, genus nervosum eius, sine dubio, quasi comprimente, tanta vesicularum copia e nervis, comite febre, expressa et excreta fuit, ut aliis non fuerit superstes locus, cum insecuta simul morte.

§. 10. Femina, mariti nuperam mortem moerens, fit puerpera. Die tertio artus inferni fiunt paralytici, insequentibus noctu symptomatibus syncoticis. Femoribus internis vesicatoria applicantur. Bolus datur ex sale vol. succ. gr. 8. Croci gr. 4. pulv. e Chel. canc. scrup. i. Die insequente tumor et dolor in partibus paralyt. Ob suspicionem de futuris miliis, diaphoresis, ex chel. canc. et croco vrgetur. Apparent etiam mox in pectore. Accedunt vigiliae, et die quinto musculorum laryngis hysterica leuior conuulsio. Dantur pil. ex asa foetida et castoreo: nihilominus respiratio difficilior, et vesiculae miliares plures, quae diaphoreticis aluntur. Contra dyspnoeam ol. lini commendatur, quavis hora sumendum: hinc dolor mitior, spiritus refectioni, et milia laudabilia. Datur et decoctum album. Brachiis vesicatoria applicantur. Interim restat dyspnoea, cum diarrhaea et lateris dolore. Recusatur ol. lini, ergo emulsio amygd. datur. Verbo, elapsis quin-



quindecim diebus, motus in partibus paralyt. reddit, cum insecuta aegrae sanitate. Hamilt. Hist. II. (Retrogressis miliis succedens paralytis, semper diaphoret. sublata, legatur in Coll. Vrat. 1719. Octob. p. 426 )

§. II. Ex iisdem Coll. Vratisl. 1719. mense Iunio, memorabilis producendus est casus, de usu remediorum antihyst. in hac febre. Puerpera primis diebus sat bene habet, mutatur autem per febrim in peius, adeo, ut die septimo, octavo et nono, cum maximis anxietatibus intense deliraret, et sub his purpura alba sparsim, in corpore, maxime vero in pectore appareret. Lochia, antea tarditatis accusata, rite tamen fluebant. Dantur bezoardica, vterina, et emulsio ex seminibus. Persistit delirium. Propinatur itaque cochleatim, mixtura ex aquis, ceraforum, samb. aliisque, cum aqua hirund. cum castoreo, addita ess. Laud. hysterica, aegra ipsa, talia roborantia, sub dulcium titulo, postulante. Hinc non solum lochia copiosiora, grumosa, sed et delirii, et vigiliarum finis; succedente somno placidissimo diuturno, et strenuo ad cibos appetitu, cum insequente plenaria sanitate. Exterminata quidem iam diu est ex dispensatoriis aqua hirundinum cum castoreo, verum combinatio castorei cum crasi avis, perpetuo mobili aemulae, et ab insectis singularibus vivente, forsan non vilipendendum constituet antihystericum. Ripariae ob victum, et habitacula vliginosa, merito praeferuntur.

## CAPVT III.

*De febre miliari, Purpura alba dicta,  
idiopathica et symptomatica.*

**P**erpenſa, in capite praecedente febre miliari ſymptomatica puerperarum: nunc in praefente aliorum ſubiectorum febres miliares idiopathicas et ſymptomaticas, promiſcue producemus. Ex copia enim hiftoriarum vnice morbi genius exponi poterit.

§. I. Adoleſcens, annorum ſeptendecim, ſtudiis non leuiter deditus, mox, a commotionibus animi iracundis, dolore nuchae et maxillarum corripitur. Tertio die ſequitur oris tetanus, et capitis dolorificus opiſthotonus. Ori, modèſta vi aperto, infunditur rad. Ipecac. et crem. tartari, ana ſcrup. i. Euomit materiam ſpermatis ranarum ſimilem; lingua fit tumida, atro rubicunda, aphthoſa. Dantur remedia congrua, et inprimis Eff. Scordii concentrata ad diaphoreſin. Sexto die apparet purpura alba: excretionem, variis conuulſiuis motibus, interpolata. Morbus grauis per ſex durat ſeptimanas, cum inſequente ſanitate: tantam autem ſpaſmi in eius corpus, hoc tempore exercuerant malignam violentiam, vt, morbo ſuperato, vertebrae dorſi interius preſſae offenderentur, in tantum, vt ſternum praeternaturaliter emereret, et ſiniſtra ſcapula dextram ſuperaret.



§. 2. Puer decennis, a strepitu insolito, improuiso, adeo terrore percellitur, ut tremens, et titubans, mox lectum petere cogeretur: febre statim, cum multo sudore insequente. Quarto die purpura alba adest. Anxietates praesentes vomitu spontaneo soluuntur. Prodest maxime, interpositis diapnoicis, Ess. Castorei. Decendii spatio conualuit.

§. 3. Alius, eiusdem fere aetatis, puer, a castigatione malefici publica, quam exerceri videbat, adeo animo perterrebatur, ut domum redux factus, lectum anxius peteret, et tertio die, cum sudore effuso purpura alba afficeretur. Methodo leniori diapnoica ad pristinam reducebatur sanitatem.

Omnes hos tres casus ex immediata commotione generis nervosi ortum suum habuisse luculenter apparet. Hinc, quae secutae sunt febres miliares, idiopathicae sunt habendae, a nullo miasmate quodam venenoso communicatae, nec alius morbi obstetricatione ortae. Materia gelatinosa primi aegri, spermatis ranarum similis, saepius in hypochondriacis et hysteriis observatur, diutius communiter ante collecta ex mesaraicis glandulis. Hic vero a crispatura glandularum ventriculi mox generatam fuisse credibile est.

§. 4. Adolescens octodecim annorum, plethoricus, mense Nouembri perfrigido, in febrem incidit, quasi catarrhalem, praevia corporis lassitudine. Tolerat hanc in aura frigida, orthostadus,

dius, per triduum. Iunguntur vigiliae, cephalalgia, et vomituritio. Applicat contra cephalalgiam, fronti acetum, pane et sale temperatum. Die octauo morbi chirurgus purgans propinat, quinque efficiens sedes. Debilis est aeger, et de dolore in sinistro hypochondrio queritur, cum lingua quasi paralytica. Fauces humore viscido repletae sunt, quem vel sponte reddunt, vel syringa eluere opus est. Iacet sibi quasi nescius, absque loquela, suspirans. Secatur vena frontis, et sanguinis circiter quinque emittuntur vnciae. Applicatur simul vesicatorium in nucha. Aluus est diarrhaeodes. Somnus profundus, et grauis. Pulsus mediocriter febrilis, tensus tamen, et quasi reciprocus. Septimo die purpura pellucida, in axilla dextra tantum. Octauo, in pectore eius copia. Sudor fere nullus. Aphonia maior. Potentia corpus mouendi sufficiens. Pulsus febrilior, i. e. celerior ictu, et frequentior repetitione et numero; exilis tamen. Frigus circa manuum carpos. Viscidum ex faucibus, mediante syringa eductum, striis sanguineis est notatum. Nullus tamen in faucibus est tumor, ideo illarum constrictioni, et inde sanguinis stagnationi, in illis attribuendae sunt striae. Nono die omnium pustularum miliarium exarescentia. Frigus manuum maior. Deglutitio valde impedita. Respiratio, aperto ore, anhelosa. Cum haec omnia affectum neruosum, hypochondriaco-hystericum dictum indicarent, et simul pro signo huius affectus pulsus in cordis scrobiculo obseruaretur, aegro, die decimo, hypochondria, vti feminis solitum



solitum est, fascia ligantur: quibus vix peractis, qui antea, nictu capitis ad interrogata respondebat aeger, nunc distinctis respondet verbis: et qui per triduum, omnia excrementa, inscius in lectum reddiderat, nunc ad sellam pro alui depositione duci petit. Vinum aromatizatum, saccharatum, additis granis aliquot castorei, ipsi offertur, sed deglutire nequit; cum alias mulieres hystericae, communiter, post factam cum fascia, cincturam, facilius deglutiant. Umbilico imponitur Empl. de Galbano; oleumque Galbani nuchae illinitur; nihilominus loquendi impotentia augetur. Facies ipsi a natura, florida, maternae similis, nunc magis rubet, non resorbto satis a capite sanguine. Manus frigent, et pedes, a stagnante, in abdomine sanguine, valde calent. Pulsus fit exilissimus, et aeger die vndecimo moritur.

Febris catarrhalis generavit miliarem imperfectam, symptomaticam; ex raptis in consensum nervis mesentericis, symptomata hysterica, pulsum epigastricum, cet. producentem. Similem casum affert *Hamilton* historia vltima, de iuvene sexdecim annorum, a febre maligna petechiali correpto, cum loquendi impotentia, et stupore; quae symptomata, per applicatum capiti aliisque artubus, vesicatorium, in tantum cessere, ut balbutire ceperit. Urinam inscie misisse refert: tandem autem aegrum, elapsis duo hebdomadibus, coxis sphacelatis mortuum fuisse. Praeter alexipharmaca, et corticem peruuvianum, non datum aliquid fuit aegro, de antihystericis, masculo aegro,

aegro forsan non quadrantibus putatis. Conueniunt autem saepius in maribus oppressiones hypochondriacas patientibus, adeo vt felicius ferant interdum castoreum, quam feminae.

§. 5. Virgo quindecim annorum habitus corporis debilioris, tempore verno, prima vice, copiose, comite narium haemorrhagia, menstruat. Adest simul alui adstrictio vndecim dierum, quae post varia frustranea, tandem fumo tabaci, in anum inflato, tollebatur. Ex his valetudinaria facta, cum secundae menstruationis terminus iuste non sequeretur, in febrem incidit acutam, cum dolore dorsi, susurro aurium, cephalgia, delirio risu, linguae tremore, conuulsionibus leuioribus, pulsu tremulo et repente, tendinum subsultu, sudore profusissimo, aluo simul diarrhaeode, vrina tamen cocta, vigiliis, et interpellata floccorum lectione. Omnia haec terrifica in primo morbi triduo. In pede itaque saphaena primo aperitur, cruribusque vesicatoria apponuntur. Motus conuulsiui inde rariores, nec, nisi sub motu corporis, excitantur. Datur mixtura ex antim. diaph. conchisque praeparatis, et aquis diapnoicis, cum spir. salis ammon. drachma. Pro potu est decoctum hordei cum cortice citri. Die quarto, cum de vigiliis quereretur aegra, nec pulsus rythmum, siue naturalem, siue febrilem rediret, sed tremulus semper esset, lap. cancr. gr. 10. sacch. saturni gr. 3. Laud. op. granum semis, in puluere dantur. Pulsus ad haec non adeo tremulus, ad minimum per duodecim horas remiserat talis



talís esse. Nullus tamen somnus: ergo die quinto, tempore pomeridiano, lap. cancr. gr. xii. camphorae gr. i. Laud. op. gr. i. pro dosi porriguntur. Nullus ex his, per quinque horas, somnus, quin delirium auctum esse videbatur: licet convulsiones minuantur. Excernit lotium inscia, et floccos diligenter legit: hora sexta tamen in somnum labitur, quatuor horas durantem, adeo placidum, ut dormienti pulsus explorari potuerit, qui nunc plenior, et tardior (non adeo celer ictu) et rarior (non adeo frequens ictu) erat, naturali propinquans. Post somnum sudor, hactenus profusus, moderatus. Delirium rarum. Motus convulsiui, et floccorum lectiones rariores. Pulsus febrilis, celer et frequens, rhythmicus. Urina rubicunda absque sedimento. Die sexto datur idem pulvis opiatus, absque insequente delirii augmento, cum eodem effectu somnifero. Die septimo vesiculae milares in collo et pectore apparent. Datur idem pulvis ad somnum, cum optimo effectu, licet sub somno palpebrae multum nictitent. Die octavo, rec. aquae theriac. vnc. v. sal volat. c. c. gr. 3. spir. sal. amm. drach. i. Diascord. Frac. drach. ii. M. capiat quovis bihorio cochl. vnum. Versus noctem datur idem pulvis opiatus, additis, hac vice, sacch. saturni granis duobus. Post somnum placidissimum, et miliorum magnam efflorescentiam, die nono, urina cum sedimento carnei coloris, ipsa superne tenuis. Delirium nullum, motus convulsiui nulli, pulsus tamen febrilis, contractus, renitens, cum aurium suffuro, et narium haemorrhagia. Ergo, ad sanguinis libe-

riorem.

riorem circulum, per diapnoen promouendum, recip. aquae fl. samb. ceras. nig. ana vnc. tres, confect. alkerm. dr. tres, spir. nitri dulc. dr. 2. quauis hora cochleatim dandum. Versus noctem autem, aluo per clysterem frustra prouocata, ther. caelest. gr. vnum, laud. op. gr. semis, lap. cancr. gr. x. dantur. Nox inde insomnis, nisi quod horis matutinis aeger dormiuerit, sub modico sudore. Die decimo alui obstructio, quinque dierum, per clysterem soluitur. Erumpunt milia nunc noua, prioribus exarescentibus, die existente placido. Additur hesternae mixturae spir. bezoard. Russi drachma vna. Dies vndecimus placidus, post noctem somniferam, cum miliorum excretionem. Dies duodecimus idem, sub eiusdem mixturae usu. Die decimo tertio nulla amplius efflorescentia miliorum, et priorum desquamatio. Ergo, roborandi fine, rec. ess. cort. aur. vncia semis, spir. bez. Russi, et sal vol. ol. ana dr. semis. M. capiat ter in die 30 guttas. Sub cuius remedii usu plenarie conualuit.

Symptomatica habenda est haec febris miliaris, albae purpurae, ob turbatam corporis oeconomiam per haemorrhagias, vnde generis nervosi adfectio subnata fuit, per miliorum excretionem se manifestans.

§. 6. Vir annorum sex et triginta, habitus corporis tenerioris, et laxioris, tempore vernali, prius cephalalgia, mox lassitudine, et febricula corripitur. Procedit nihilominus in publicum, et tertio die lectum petit. Quarto sibi venam secari facit.



facit. Febris interim augefcit cum cephalalgia et perpetuis vigiliis, vt die fexto delirare inciperet: quo ipfo die fimul purpura alba efflorefcit. Ob delirium continuans fecunda vice vena fecatur, clyfteres infunduntur, fimulque decoctum tamarindorum cum nitro propinatur: aluo fic abunde foluta. Sed delirare continuat aeger. Dantur aquae diapnoicae, cum abforbentibus variis, fed perdurat febris vehementia. Die octauo et nono, per adhibita remedia theriacalia, delirii ceflatio, et pulfus fere naturalis. Continuant autem vigiliae, et aeger de ftupore totius corporis, et cordis preffione queritur. Redeunt itaque deliria die vndecimo, cum febre. Pustulae miliares femper nouae, prioribus exarefcantibus. Medicus delirii caufam in inflatione encephali haerere iudicans, tertia vice novem fanguinis uncias, (quot iam bis effluxerant) mitti iubet. Applicantur fimul clyfmata euacuantia, et die duodecimo, raso capiti Oxoleum applicatur; fimulque nuchae veficatorium. Sed moritur aeger die decimo tertio. Ob caufam pertinacis delirii, nec venae fectionibus, nec clyfmatibus, nec tamarindinatis purgantibus cedentis, cadauer fecatur, et fequentia reperiuntur: 1) Intra cranium nulla inflammationis figna; 2) vafa fanguinea, tam meningum; quam cerebri, omne fere fanguine deftituta; 3) finus maiores durae matris fanguine vacui; 4) in fummitate cerebri, circa fedem glandularum Pachionis, inter infractuum fulcos, fub pia matre, pauca lymphæ extrauafata, vnde pia mater paululum tenfa, et turgens; 5) ven-

C

tricoli

tricoli binī laterales, plus quidem lymphae, solito, continebant, non tamen abundanter; 6) plexus choroiaedus pallidus, in latere dextro pallidissimus; 7) glandula pinealis lapillis referta; 8) substantia cerebri satis consistens, medulla oblongata, notorie duriuscula; 9) cor, pericardio, ex defectu humiditatis concretum; 10) ambo ventriculi cordis, atque auriculae, sanguine carentes; 11) musculi inter secandum pallidi, et ficci; 12) stomachus cum intestinis absque labe; 13) vesicula fellis iustae magnitudinis; 14) pinguedo circa pectus, et abdomen rara, et coloris quasi Phthisicorum, et hydropicorum; 15) summa, de reliquo, in toto corpore siccitas, et sanguinis carentia.

Ad symptomaticas quidem referenda esset haec febris miliaris, quia febris vernalis primam ipsi praebuit ansam: verum grauis principii nervorum affectio, ex depauperatione sanguinis, in corpore tenero, et omnium humorum, per sudores, et purgantia, euacuatio, illam fere idiopathicam fecerunt. Remediorum theriacalium praesens, die octavo, expertum auxilium, continuationem illorum rectius commendasset: illis enim mediantibus, humores cerebrum blande demulcissent, nec ad consistentiam substantiae eius, forte naturali densiorem, vti in Phreneticis saepe esse solet, transire fuissent. Febres acutae saepe, per se, omnem exhauriunt sanguinem.

§. 7. Femina maritata, habitus corporis cholericī, annorum triginta tres a tussi sicca, et scabie,



scabie, per aliquot menses iam vexata, nunc, post hyemem rigidam, verno tempore, bis menstruationem passa est, solito pauciorum. Sic valetudinaria reddita horrore corripitur, cum insequente aestu febrili. Orthostadia tamen manet per biduum, donec valida oppressio pectoris illam lectum petere cogit. Medicus tertio die vocatus pulsum celerrimum, et simul exilem apprehendit. Urina est tenuis, absque sedimento. Aestus volatici. Sudor nullus. Dantur temperantia, cum salibus mediis, et die quarto vena in pede secatur. Eodem die purpura, partim rubra, partim alba in collo adparet. Datur versus noctem anodynum, ex quo per duas horas dormiuit. Die quinto continuatio aestus febrilis. Clystma emolliens injectum feces educens pectoris oppressionem minuit. Die sexto noctem valde aestuosam se habuisse enuntiat aegra. Applicantur tibiis vesicatoria, et iterum clyster emolliens. Emulsio datur ex amygdalis, femin. frigidis maj. et ex drachma vna sem. violar. ex qua binis vicibus sumpta, septem sequuntur sedes. Vesicatoria, quae ante has alui euacuationes valde vrebant, nunc vrere desinunt. Interim versus vesperam nullus sudor, anxietas maior. Pustulae miliares perstant, et exarescunt, nouis semper superuenientibus. Cephalalgia moderata; susurrus aurium vero valde molestus. Die septimo aestus febrilis summus, temperantibus, et nitrosis, diluentibus non cedens. Nullus sudor. Urina clara. Vigiliae. Die octauo sanguinis ex naribus stillicidium paruum. Pro potu est Thee, vel aqua, in qua panis

maceratus. Alius diarrhaeodes; hinc nullus sudor. Fluente ex vesicatoriis copioso sero, versus noctem datur laud. op. gr. sem. camph. gr. i. croci gr. 4. cum lap. cancr. citr. Die nono nocte nullus somnus, nec sudor. Tentatur diapnoen excitare aquis diapnoicis, parcissime liquore C. C. succ. imbutis, sed renuit aegra. Post meridiem pulsus celerrimus et subtilissimus. Sequitur mox delirium, et paulo post vomitus, primo materiam cruentam, ex narium stillicidio forsan restitantiem, mox autem saburram biliosam explodens: cui statim agones succedebant, et vitae finis. Corpus per multas horas remanebat calidissimum, gangraenae viscerum signum.

Quibus iam valetudinariis accedit febris, cum insequente excretionem miliorum, illa miliorum excretio semper symptomatrica est habenda, et quidem pro symptomatum conditione, et nervorum robore, maxime vero viscerum inflammatorum statu, plus vel minus periculosa.

§. 8. Vir annorum sex et triginta Ecclesiastici ordinis, temperamenti melancholici, et vitae sedentariae. Hinc multis turbis hypochondriacis obnoxius, tempore verno corripitur ab horrore febrili, cum insequente aestu. Febres intermittentes tunc temporis valde grassantes, horrorem huius esse naturae interpretabantur. Perdurante autem aestu, cum debilitate, et pectoris oppressionem, febrem acutam sub herba latere iudicabatur: ipsamque febrem miliarem ante fores esse ardore



ardores brachiorum et vigiliae cum inquietudine indicabant. Apparebant itaque die quarto, milia, in collo, pectore et manibus. Aeger die quinto, de sanitate recuperanda desperans, vsum sacrae synaxeos vrgebat. Quia autem mitior erat febris, delirium nullum, appetitus in totum non prostratus, illam differendam esse suadebatur, donec tandem, pro aegri urgente voluntate, die septimo, his sacris vteretur, cum tanta rerum mundanarum resignatione, et coelestium cupiditate, vt peracta synaxi, se mortuum, et quoad animam coelo, et finui Abrahami traditum, firmiter crederet. Pulsus interim huius pseudo-coelicolae erat moderate febrilis; vesiculae miliares perstabant sub sudore moderato, et putitium cadauer interdum leui somno refocillabatur. Quando mortuo huic allocutio fiebat, vel potus offerebatur, ventriloquus respondebat, se mortuum esse. Cum regeretur, insolitum esse, quod mortui respondeant ad interrogata; hoc nullatenus aiebat, pro responso habeatis, sed pro confuso pulmonum sonitu, et simul cadaueris sui sepulturam vrgebat. Interim bonis verbis saepe cedens hoc cadauer, semper aliquid oblati, grati potus hauriebat, quin poma oblata belle comedebat, et tandem applicationem enematis permittebat. Aluo per hoc bene educta, vigiliae omnes placido, et naturali cedebant somno; post quem hic demortuus se inter viuos rursus esse nullus dubitabat, moxque sanitati redditus, delirium suum cum amicis ridebat. Eandem scenam, aliquando, femina viginti quinque anno-

rum, angina, cum passione hysterica, laborans, post usum sacrae eucharistiae, ludebat, et se mortuam esse credebat: sed citius, paucarum horarum spatio, rediuiuam se esse intelligebat. Turbis hypochondriaco - hystericis obnoxiiis subiectis, febris miliaris semper sympomatica est habenda.

§. 9. Femina quaedam corripitur ab horrore febrili, cum insequente aestu, et cephalalgia intolerabili. Vena in brachio secatur, absque mali moderamine. Die quarto menstrua, et quidem iusto citius accedunt, et die septimo vesiculae crystallinae numerosissimae. Accedit delirium, cum tendinum subsultu, et somnolentia cum stupore. Dantur alexipharmaca. Die decimo quarto linteamina capitis mutantur. Recrudescit cephalalgia atrox, febrisque denuo exarsit. Manet aegra per triginta dies immota in lecto, et omnia excrementa, alui et vesicae, inscia exonerat. Perstant semper vesiculae numerosissimae, et tandem circa trigesimum diem albescunt, aegraque simul ex veterno, ad viuos, et ad sanitatem redit. Attamen, nodi in digitis postea exoriuntur, morbum hunc generis neruoso - arthritici esse declarantes; ideoque hanc febrem miliarem in numerum idiopathicarum referentes. Ephem. N. C. D. III. A. VII. VIII. Obs. 206.

§. 10. Vidua a maculis, morbillos mentientibus, comitante tamen febre, corripitur. Restituitur ex hoc morbo, in tantum, ut extra lectum esse potuerit. Conuellitur autem denuo ab horrore



rore febriili et tertio die vesiculae miliares apparent. Artus dolent, quasi ab arthritide. Die quinto superuenit delirium, vesiculis disparentibus, cum vrina copiosa, ceu naturali. Pulsus in momento fit debilior, respiratio tardior, et intra quinque horas, hac morbi catastrophe, ad plures abit. Ephem. Nat. C.

Idiopathicam declarant, dolor artuum et milia subito excreta. Interim simul extremitates neruorum a maculis vicinis inquinamentum quoddam hausisse videntur milia cum manifesta arthritide vide §. 15.

§. II. Quadragenarius medio Maii mensis sentit se male habere, cum horripilatione, et lassitudine. Licet etiam crura leuiter, a spasmo quodam dolerent, nihilo minus postero die, aurae se exponit frigidae. Domui redditus cephalalgia laborat, et coryza. Accedebat mox Erysipelas totius faciei, quod vnicae venae sectioni cedebat. Aderat autem die sexto febricula, et quidem quotidiana. Licet Erysipelas totum dissolueretur, febris die octauo maior reddita, cum inquietudine, grauitate capitis, et vagis corporis doloribus, largiorem venae sectionem requirebat. Durabat tamen febris adhuc quatuordecim dies, cum horripilationibus irregularibus, aestu, sudore, anxietatibus, vigiliis, vel insomniis spectra alba, quae aegrum occupare vellent monstrantibus. Dolores sentiebat, quasi corpus cum aciculis perfoderetur. Maximos dolores et cruciatu ipsi dabant formicationes digitorum, manuum

pedumque, cum impotentia illorum extremitates mouendi, cum spasmis tamen, a quibus nullatenus leuabatur, quoad crura, nisi quando haec vi aliqua complicarentur. Augebantur hi spasmi sub morbi successu, cum sudore foetido, et acido. Die morbi vigesimo secundo tandem milia apparebant, cum pulsu pleno et forti, non tamen valde febrili, lingua bona, itidemque ore, simul absque capitis, pectorisque dolore. Molestae autem erant puncturae in locis, in quibus pustulae erumpabant miliares. Hae, durantibus tribus nycthemeris per totum corpus apparebant, minus confertim autem in pedibus et manibus, in quibus tamen insultus dolorosi maximi fuerant. Post dictum tempus exsiccari incipiebant, et aeger spatio tres et triginta dierum conualescebat. Vltus fuerat durante hoc morbo sex purgationibus, per interualla tamarindis, manna, et sale vegetabili, datis. Quoties illas sumebat, totus valde debilis euadebat, sed die insequente bene se habebat. Potus ipsi fuit, decoctum hordei, c. rad. taraxici. Ad sopiendos dolores, et ad sudorem vltus est infuso flor. papav. rubri. In fine curae aeger per quatuordecim dies, quolibet mane, decoctum de collo veruecis, cum acetosa, nasturtio, cichoreo et pimpinella bibit. Fere eodem modo curatus est hic aeger, quo vir triginta sex annorum §. 6. Differentia effectus autem fuit in differentia roboris naturae. Erysipelas faciei quidem dolorem obtusum capitis habet comitem, sed raro deliria, nunquam graua. Infusum sopiens hic melius adhibitum fuit, quam in allegato aegro perpetua  
refri-



refrigerantia ob praesumptam encephali inflammationem. Nec male, imprimis ipsis aëgris poscentibus, et in statu febrili mitiore, iuscula carnea exhibentur, communicant enim sanguini et nervis volatile quoddam, macrum quidem, pro tempore tamen sufficiens. Idiopathicam tamen haberem potius hanc purpuram albam propter moram, quam exercuit seram ad excretionem, et propter spasmos vehementes qui praecesserunt, quam symptomaticam.

§. 12. Quadragenarius, tempore hyberno febrim continuam, cum multo sudore, et vigiliis patitur. Die quinto adest purpura pellucida in fronte, pectore, et manibus. Dantur nitrosa, aliusque lenibus laxantibus subducitur. Die septimo accedit colli spasmus, ex quo caput modo dextrorsum, modo sinistrorsum trahitur, usque ad diem decimum, quo aeger moritur.

Idiopathicam fuisse hanc febrem miliarem quis dubitabit ex intemperie succi neruei, musculos colli adeo peruerse agitantis, et medullam oblongatam cum ipso cerebro quassantis.

§. 13. Vir annorum triginta quinque, de dolore in nucha queritur, quo perdurante, post aliquot menses, paraplegia, paralyti truncali corripitur. Decumbit miser per aliquot septimanas, donec febre, macie, et tandem sphacelo partium inferiorum, pro huius morbi natura, moreretur. Quatriduo ante mortem, a paralyti hac, (tono forsan a putredine volatili partium sphacelatarum,

rum, restituto) liberatur: in facie autem, fronte, et nuchae parte superiore, quatenus salubritas et vita in his partibus fuit, vesiculae miliares exsurgunt. Post mortem in locum, ante dolentem, inquiritur, et ecce, secunda colli vertebra tota cariota deprehenditur.

Idiopathica fuerunt haec milia a nervis salubribus compressis succum suum halituosum eructantibus. Eodem modo aliquando in infante oris tetano mortuo, maxillarum spasmo, in facie apparebant.

§. 14. Vidua annorum triginta quinque, febre lenta hysterica, ex fluore mensium irregulari laborabat, coniunctis variis spasmodicis affectibus, doloribus abdominis, oppressione pectoris, aluo adstricta capitis sensu grauatiuo, et vigiliis. Data drastica purgantia, et emmenagoga omnia in peius vertunt. Frigus cum calore alternant; maxime autem frigus ceruicem et verticem, saepe cum animi deliquiis, occupat. Cibi omnes, sicci, et fluidi angustias, vt praecordiorum oppressiones pariunt. Febriculae lentae coniunctae sero lactis obuiam itur, nunc acidulo, nunc dulci, et licet menses per amaricantia lixiuiosa, suo redirent tempore, sudoresque profusi remissiores essent, aluus etiam melius responderet, simulque ipsa febricula mitior fieret, nihilominus haec tragoedia duodecim durabat septimanas. Tandem cortex peruianus, ceu roborans, resoluens, et sedatiuum, in febribus lentis, et intermittentibus adhibetur, quo impuritates, stagnantes  
et



et partes solidas adficientes per cutis vascula eliminari possint. Datur igitur, iuncta limatura martis, et simul interdum iuscula auenacea, interdum gallinacea. Quo vero ita resoluti humores eo melius ad cutim determinarentur, *ter in die, totum corpus, panno laneo, vapore succini imbuto, fortiter, per integram horam frictum est.* Sic octiduo elapso, iam in abdomine exanthemata apparebant; elapsis autem, sub hac interna, et externa medicina, *tribus septimanis*, vniuersa corporis superficies purpura vesiculari confertim obfessa fuit, et aegra per dimidium annum misere afflicta, sic conualuit. Ex Primit. Med. Polon. Vol. I. p. III.

Ad plus quam gymnasticam medicinam, hanc violentam manualementem referre licet, et excretionem hanc pure artificialem appellare; quacumque aliquantulum conueniunt illae productiones, quas capite primo §. 7 et 8. allegauimus. Auctor putat per haec exanthemata malignum quid e sanguine eductum fuisse. Verum quis crederet, parcissimam hanc halituosam materiam, in sanguinis massa detentam, febris adeo grauis, et diuturnae causam fuisse, et vnice adeo violentam excretionem, per tres septimanas productam, expectasse. Neros, violenta hac frictione animatos, et excretionem elasticae cuiusdam materiae a spasmo liberatos, sanguini prius circulationem se-et excretoriam, et tunc aegrae sanitatem reddidisse, in patulo est. Ipsae vasorum sanguinehorum extremitates, a sanguinis aliquanti stagnatione

tione liberatae sunt, et vna cum nervis, per frictionem sale vol. succini animatam rem perfecerunt. Dubium sane manet, et restat, an halitiosa materia sub vesiculis latitans male fuerit indolis, vel illis similis, quas allegauimus, per saponem et emplastrum prouocatis. Egregie autem adhibita fuit haec methodus, non solum magna ex parte antifebrilis, quam ad vires vitae sustentandas aptissima. Dudum clamatum est contra purpuram albam artificialem, nempe illam, quam crediderunt medicos remediis alexipharmacis producere; haec artificialis autem non damnanda est, et multis conueniret aegris.

§. 15. Vir annorum triginta sex, robustus, floridus, mense Ianuario, arthritidem patitur, in genibus et scapulis, vagam. Superuenit febris. Secatur vena. Dantur nitrosa, aliaque antifebrilia. Durat tamen malum, cum febre, sudore, pruritu, anxietatibus multis, vrina pallida. Die decimo aeger indusii mutationem poscit; obediunt adstantes; calescit nouum quoddam: vix autem vetus sordidum a corpore detractum est, cum totum corpus a vesiculis miliaribus oblitum deprehenderetur. Prius itaque indusium in corpus reponere cupiunt; renuit autem aeger, et nouo induitur. Refocillatus bene habet; persistant vesiculae, et febris tandem cum illis et arthritide feliciter cedit. Saepe purpura alba se iungit idiopathice arthritidi. Ob indusii innoxiam mutationem hunc casum solum allegare placuit. Sequens casus hoc respectu notabilior est.



§. 16. Vir annorum triginta, texturae tenerae, femineae, effeminatus, *Hamiltono*, viuacissimi tamen temperamenti, luis venereae reliquiis, cum dolore in perinaeo laborat. Poscit sibi saluationem mercurialem. Subit illam mediante mercurio dulci, quotidie gr. v. dato, et spatio quatuordecim dierum illam absoluit. Cum hanc quietissime in lecto, sub potu copiosissimo decocti auenacei mucilaginosi, ex alica parati sustinuerat, sudor inde commotus magnus, magnum pruritus in cutē excitabat, praesente adhuc, ex ipsa saluatione, febre. Diarrhaeam simul patiebatur, vel adhuc ex mercurio, vel ex copioso potu decocti auenacei mucilaginosi. Singulare autem comitabatur diarrhoeam phoenomenon, quod post exclusas feces, gelatina quaedam pellucida, spermatis ranarum consistentiae (§. 1.) interdum flauescens, interdum autem viridescens, sequeretur. Finita saluatione, aeger in lecto adhuc morans, pulsus molestum in hypochondriis, et praecordiis sentit, vna cum magnis anxietatibus (§. 4.) qui aegrum antea diserte *Atheum*, pro nunc *Theophobum* faciebant. Aluus per multos dies fuerat obstructa, ideo clysmate emolliente soluebatur. Aeger pruritus magni impatiens, balneum tepidum in vanno intrat; sub introitu autem corpus suum pustulis miliaribus totum obsitum esse obseruat. Vt erat homo audax, propositum non mutat, sed lauari et fricari totum corpus facit. Sic bene lotus et frictus abolito infenso pruritu, rectum repetit, adeo recreatus, vt vsum balnei satis extollere nequi-

nequiret, et quidem cum insequente euphoria, et pristina mentis impia conditione, ex qua etiam, non diu post, autocheiria periit.

Symptomaticam iudico hanc miliorum excretionem, ex febre per salivationem excitata; quae orgasmum succi neruei induxit, vt eius halitus vaporosus in illorum extremitatibus mediantibus vesiculis apparuerit. Symptomata autem, quae patiebatur, hysterica dicta, theologicas illas anxietates extorserant; ex symptomatibus autem elucescebat spasmus neruorum mesenterii, omne systema neruorum, quin ipsum principium, cerebrum, in consensum trahens.

§. 17. Femina maritata a delirio melancholico corripitur, ex quo gemebunda fit, et anxia, homines et lucem fugiens, quin de animae salute desperans. Datur vomitorium, martialia, aperientia, aliaque remedia conuenientia, sed frustra. Pulsus ipsi restat durus, et celer febrilis; imo interdum intermittens, cum cardialgia. Datur itaque sal volat. succini, cinnabaris, nitrum cet. Sub his sudor elicitur, et simul in praecordiis purpura alba. Qua copiosius erumpente, febris, cum delirio melancholico cessat, et sic mentis; et corporis sanitas successiue redeunt. Ephem. Nat. Cur. Cent. Obs. 22.

Symptomatica et haec fuit febris miliaris, ex stagnatione sanguinis in visceribus hypochondriorum nata, neruos mesenterii in spasmus etiam in praecordiis, vti in praecedente casu, procul dubio, pulsantem, agente, eoque ipso, non solum



lum itidem cogitationes de salute excitante, sed simul orgasmum succini neruei, ad halituosam in peripheria excretionem.

§. 18. Neonupta, viginti annorum, nocte a celebratis nuptiis media, sine causa ridere, mox quiescere, rursusque ridere incipit. Cum risum continere studet, praecordia opprimuntur cum anxietate. Insequitur febricula. Dantur diluentia, aquae diapnoicae, pulvis antepilepticus, liquor miner. Hofmanni, et alia. Risus pedetentim minuitur, corpus madore afficitur, et tunc in pectore, iugulo, et facie, purpura rubra et alba apparent. Commode itaque sub diaeta, per iuscula diluta carnae, cum incoctis radicibus scorzon. herb. chaerefol. aliisque conualuit. Act. Heluet. Vol. I. p. 47.

Quis hanc excretionem miliorum idiopathicam fuisse negabit, et quidem ex irritatis nervis vterinis, qui non solum intercostales ad risum coegerunt, sed etiam omnem nervorum succum ad orgasmum halituosum excitarunt? Notandum etiam, quod haec excretio vnice partes superiores affecerit, quae in tali venerea irritatione, ex sanguine per moram, circa respirationem stagnante, rubescunt et turgescunt. Nervos vterinos, illos intercostales, ad cachinnum excitasse, sub menstruatione, praeuia iectigatione brachiorum et crurum, in virgine octodecim annorum, a convulsionibus subinde vexata, lege in Collect. Vratisl. Tent. 29. p. 323.

§. 19. Feminam teneram, lactantem, annorum viginti duo, nona septimana, a partu felici, inuadebat purpura alba, cum rubra, coniunctis doloribus membrorum lancinantibus, inprimis femoris sinistri, narium haemorrhagia graui, diarrhaea, diabete, et quidem omnes hae excretiones violentae, non solum sine noxa, quoad febrim exanthematicam, et ipsa exanthemata, sed et quoad statum aegrae grauidum, quia ante morbum impraegnata fuit iudicata, (elapsis enim nouem mensibus, iterum feliciter peperit filium) adeo, etiam absque noxa embryonis, vtero vix traditi. Act. Heluet. Vol. II. p. 20.

Originem eandem haec febris miliaris cum praecedente habuit, quia mox ab impraegnatione exorsa fuit. Spasmo vario adfectum fuit systema neruosum, nunc in systema vasculosum sanguinis agens, nunc in intestina, nunc in organa diuretica, ipsum succi sui motum intestinum, et alterationem pertinaciter prodens, eructando simul vaporosum quid per cutim. Quod embryo germinans non fuerit protrusum, id non mirandum, quia in vterum non egit spasmus, sed extra illum. Notum praeterea, embryonem in primo alteroue mense non facile cedere meretricum vomitoriis, et largis venae-sectionibus, cum post tres vel quatuor menses, sola retentio spiritus sub nisu sublatis oneris illum protrudat. Haemorrhagia narium in principio variolarum valde salutaris est, cur non in hac febre? Quoad diabetem vide Cap. II. §. 4. Ante multos



multos annos hic moriebatur Neonupta, secunda a Nuptiis septimana. An febre miliari, ignotum manebat. Plures Neonuptarum tales casus, nouum genus febrium Neonuptarum miliarium constituerent, et medicorum mentes ad meditationes quasdam prophylacticas antenuptiales persuaderent.

§. 20. Febribus inflammatoriis interdum se iungit purpura alba: de quo testantur Eph. N. Cur. Cent. II. in App. p. 2. quod, sub initio huius seculi, mense Februar. pleuritides epidemice grassatae fuerint, diligenti pectoralium et diaphor. temperatorum usu, etiam sine venae sectione curabiles: quibus, in nonnullis, mense Aprilis, cum iam in decrementum vergeret epidemia, noua febrilis efferuescentia superuenit, cum eruptione pustularum aquearum per totum corpus, maius periculum minitantium; aegrotis tamen, per continuatam alexipharmacorum blandiorum adhibitionem, intra primum, quandoque intra secundum octiduum reconualescentibus. Quemadmodum supra, Cap. II. § 9 MENZELIUS purpuram albam hydatides crystallinas appellat, ita hic, pustulae aquaeae, sine dubio, vesiculae nostrae miliares habentur. Quia hae pleuritides benignae fuerunt, ita purpura alba, periculum tantum minata est, nec morbo malignitatem addidit: non aliter, quam in variolis benignis, vesiculae miliares periculum non augent. Vbi autem morbus primarius grauis est, et ex constitutione aegri, vel ex sanguinis crassi acriori systema neruosum suum nutrimentum et succum haurit, ibi scena

D


periculi

periculi plena aperitur: nerui enim vehementer sub febre inflammatoria simul vruntur, et sub ardentissimo sudore pruriunt: deliria phrenetica et conuulsiones cerebrum, et systema nervosum agitari indicant, dum pars inflammata in necrosin abit, illamque massae sanguineae communicat. Systematicae sunt iudicandae hae febres miliares in casu utroque. Huc referenda sunt benigna illa milia Coll. Vrat. Anni . . . aquosa etiam dicta, Wasser-Friesel.

§. 21. Aliud exemplum febris inflammatoriae, cum excretionem purpurae albae, exitus contrarii. Vir annorum quadraginta, habitus pleni, teneri, feminei, diaetae vinosae indulgens, ex cibo quodam pingui male habens, reuomito autem rem optime cessisse putat. Obiit itaque negotia sua sub aura frigida, febrili aestu iam abunde correptus, per triduum. Decumbere tunc coactus, ob aestum magnum febrilem anxietates accusat, et pectoris oppressiones, cum intestinorum leui dolore. Vena secatur, antiphlogistica adhibentur, enemata emollientia applicantur; sudat nihilominus valde, et obtegi ipse cupit, id quod, quia febris inflammatoria intestinorum habetur, reprobare, auramque peripheriae corporis admittere, diaphnoon impedire, iniustum fuisset. Pruritus simul in cute sentit, qui sudoris habetur effectus, et flocci habetur. De magna tamen simul debilitate queritur aeger. Excretio urinae modica, et absque sedimento, uti in turbis intestinorum esse solet. Inter alia conuenien-



tia remedia, etiam cortex peruuianus, ad intesti-  
 norum vitam conseruandam, in substantia, ali-  
 quoties dabatur. Verum die decimo singultus  
 accedebat; et cum die insequente enema appli-  
 candum censeretur, et apparatus ad eius applica-  
 tionem fieret, ecce sphincter intestini recti totus,  
 paralyti adfectus, hiabat, et suspicionem de gan-  
 graenae affectis intestinis suggerebat. Aeger die  
 duodecimo rugiente ante multum ventre, morie-  
 batur. Cum denudaretur tunc corpus, mirum  
 copiosis illud oblitum offendebatur miliis; negli-  
 genter certe, ad quorundam praecepta, habitis,  
 quia post mortem primo in conspectum venerant.  
 Symptomata etiam certo fuit haec excretio,  
 febris inflammatoriae iuncta, ex nervis aestu in-  
 flammatorio simul aestuantibus eructata, morbo  
 primario autem sane plus damni, quam auxilii  
 praebens.



## CAPVT IV.

*De natura febris miliaribus ex sympto-  
 matibus eruta.*

### §. I.

**P**raemissis sic multis casibus, et historiis, exan-  
 themata miliaria, tam absque febre, quam  
 cum febre exacte depingentibus, ad cognoscen-  
 dam huius morbi naturam nos accingimus. Quod  
 itaque exanthemata attinet, quae Cap. I. abique

febre apparentia allegata sunt, et quidem primo, quae infantibus nouiter natis apparent, illa nihil aliud sunt, quam vesiculae, in apicibus minimis neruorum, ex plethora et abundantia nutrimenti neruei, natae; dum enim illae nunc fluido illo mucoso, in quo delituerunt infantes, et ex quo ipsae apices aliquid nutrimenti forsan forbserunt, carent, bibitus ille subtilissimus succus, in extremis fibrillis papillarum neruearum haeret, et has format vesiculas, mox, epidermide solidescente delendas. Exarescunt autem, quin sphacelescunt quaedam harum extremitatum, vel apicum, et tunc pruritus creant, sub comedonum nomine, et vigilias quidem inducunt, sed nunquam atrophiam, solae. Corpuscula enim facta difformia, nigra, quauis mucilaginosa materia in balneo extricari potest. Mellis enim solius necessarius putatus vsus, has extremitates viuos esse, et dulcedine proliciendos, finxit.

§. 2. Exanthemata miliaria, quae § 7 et 8 cataplasma manui applicitum, et quae emplastrum frontale euocauit, vnice per emollitionem fibrarum neruearum generata sunt, qua mediante succus neruorum subtilissimus in extremitates penetrauit. Eodem fere, licet violentiore modo, quo Cap. II. §. 4. eadem, aqua calida et frictione elicitae esse legimus.

§. 3. Quae Cap. I. §. 6. allegamus infantes, apparenter non aegrotantes, exanthemata sua, sub febricula quadam extrusisse, verosimile est, placidissima tamen, in sensum non incurrente.

Quae



Quae trigeminorum abortum, §. 10. fecerat femina, miliis suis exanthematicis, conditionem neruorum, quam sub hoc morbo subeunt et patiuntur, in fine eius abunde demonstraui. Nam, quemadmodum, quando hae excretiones absque febre, et absque alio quodam vehementi symptomate oriuntur, vti in infantibus; (nisi clandestinum oris tetanus, pusillos occupantem eo numeres) benigna spontaneitate succum neruorum excerni iudices: ita, vbi anxietates comites sunt, et febris, ibi, vel generari in neruis aliquid heterogenei, quod cordis et diaphragmatis neruos per consensum afficiat, quin saepe cerebrum, et ipsam mentem moueat, vel illos ex vitio oscillationis nupero laborare, et vtroque modo ad ipsius substantiae visibilem, vel inuisibilem alterationem. Equidem in femina, trigeminorum matre, nerui magnam substantiae suae alterationem passi sunt: robur tamen naturae, in illis restans, sub induciis intercalaribus, nouo spirituoso nutrimento locum dedit, dum prius corruptum, partim per apices neruorum, partim per poros, aliasue vias excretum est. Vbi autem tales induciae defunt, vti in femina Cap. I. §. 12. ibi natura cogitur morti tristitia illa trophaea linquere. Tunc rami maiores neruorum facile maius contrahant vitium, et cerebrum in consensum rapiunt, non aliter, quam vbi vulneratis, et in necrosin abeuntibus neruis, motus conuulsiuus, tetanus oris, et apoplexia succedunt.

§. 4. Rarior est per Dei gratiam nobis febris miliaris, vesicularis purpura alba dicta, praeter ceteris exanthematicis; alias exitialis forsan foret, quam variolae, quia illa semper principale vitae fundamentum, systema nervosum impugnat, sit idiopathica, sit symptomatrica. Vtraque interdum benigne, vtraque maligne se gerit, pro constitutione speciali aegri. Oriatur vel ex viscerum quorundam morbo primario, vel ex proprio nervi succi, vel vaginae nervorum spasmo, vel nutrientibus eius humoribus. Medici Poloni, in primitiis suis, illam fere semper symptomatricam statuere videntur, dum purpuram vesicularem, Iudaeis quotannis epidemicam, et omnibus fere illorum morbis superuenientem statuunt. Et, si Litteraria Gottingensia producere licet; (1760. n. 31.) illa ex auctore gallico *Lietaud* allegant, purpuram esse accidens morbi, naturam mali non mutans, et a natura sudoris dependens. Dicerem a natura succi nervi. Natura sudoris dependet a natura sanguinis, cuius qualitas potest esse pituitosa, vel tenuis, acida, alcalina, et simul elastica, morsicans. A natura sanguinis vero dependet etiam natura succi nervi. *Hamiltonus* ubique, in Tractatu suo de febre mil. idiopathicam producit, et quidem ex spirituum defectu, et nimio sero acido, nervis communicato: ideo alcalinis utitur remediis, et sudoriferis. *Allionus* ignotam finit rem esse, an miasma ipsi venenosum, excretio miliaris, sit alcalinae, an acidae, an animatae indolis (Comment. de rebus etc. Vol. 8.). Fauet tamen acidis remediis potenter resolvente  
medi-



medicina opus esse ad densitatem sanguinis resol-  
uendam, et in hunc finem animum ad mercurium  
sublimatum, corrosiuum adhibendum aduertit.  
Morbum hunc hydrophobiae similem esse iudi-  
cat, et ideo vsum moschi, cum cinnabari, medi-  
cinam Chinenfium commendat. Incertum sane  
est, an acredine acida, alcalinaue, vel salina la-  
boret sanguis, siue febris sit neruina idiopathica  
vel symptomatica. Qualis sanguis, talis neruo-  
rum succus, qui raro per se hunc morbum gene-  
rat, idiopathicam febrem miliarem generat, nisi  
vti vidimus, interdum animi commotione, ter-  
rore etc. fuerit indolis cuiusque, functionibus  
corporis adaequatus. Vnde ipsi, sic prouocatus,  
adeo subita venenosa indoles? Malo cum veteri-  
bus, ignotam qualitatem humoris peccantis, in-  
temperiei titulo vocare, quam falsam, incertam-  
ue fingere, et hoc eo magis, quoniam hic non  
alterantibus, sed roborantibus neruinis, et dilu-  
entibus leuiter diapnoicis, agendum erit. Quas  
idiopathicarum nomine insignauimus, et quas  
symptomaticarum, vbique ad allegatos casus cum  
rationibus addidimus.

§. 5. In febris miliaris naturam inquisitu-  
ris, primo, ex allatis historiis attendendum erit,  
quod haec neruorum febris, siue idiopathica, siue  
symptomatica, et alii superueniens sit, maxime  
infestet sexum muliebre, tam extra puerperium,  
quam in puerperio. Vel, si afficit masculinum,  
quod afficiantur, communiter, illi habitus femi-  
nei. Hinc saepe viri tales hac febre laborantes

aperte simul, hyftericum, quod vocant, malum patiuntur, vti id Cap. III. §. 4 16. notatum. Laxior femineus habitus autem ramificationibus nervorum pluribus abundat, et abundare a priori facile creditu est, quia sensibilibus hic habitus est prae illo stricto. Huius habitus viros audiui aliquando conqueri de sensu illo stuporis pungitivi in digitis, *Grans* nominato, ab *Allione*, absque tamen infecta febre miliari, et in bene valentibus. Quantis itaque morbis nervosis feminae prae viris, afficiantur variis, quis ignorat. Aliunde autem morbi nervosi originem non capient, nisi ex succi nervosi, et humorum, quae vaginam illorum nutriunt, dispositione, temperie, depravatione. Symptomatum conditio et natura, cum in nostrae inquisitionis scopum est indaganda, miramur in his primario, quod hanc febrem, vel in stantem miliorum excretionem, principaliter *Anxietates* et *pectoris oppressiones* indicent, iuncta communiter nervorum in brachiis formicatione, quin pruritu: quae ipsa formicatio etiam aliquando in pedibus sentitur. Equidem, anxietatum, et pectoris oppressorum variae sunt species, et originum variarum: praecedunt, vel comitantur interdum paroxysmum febris intermittens; corde, et hypochondriorum regione, per nervum diaphragmaticum, parisque vagi ramificationes, constrictis. Consistent thoracis nervi respirationem opprimunt, et ex illorum apicibus, communiter, in pectore maxima fit miliorum excretio. Alia vice anxietates ex nervis cerebri, menti inferuentibus primariis, ob causas morales ortas, videas



videas neruos, mesenterii tumultum in sodalitium vocare, et omnia abdominis viscera, cum anxietatum magno augmento, ad lypothymiam vsque commouere, et verum *σπλανγνιζειν* producere. Adde illas anxietates, quas vulnera et contusiones capitis generant, cum suspiriis, et pectoris oppressionibus, quales et hic, in febribus miliaribus, inprimis in idiopathicis, vtpote cerebro, et neruis magis propriis attendendae sunt. Notissimum praeterea est, omnes, malo hypochondriaco, i. e. mala circulatione sanguinis, in visceribus primariis, sub hypochondriis sitis, laborantes, et inde spasmodicos neruorum imi ventris motus sentientes, graues interdum pati anxietates, sub quibus etiam in capite, sanguinis lenta circulatio coniungitur, quae ipsa mater anxietatum fit, illi quodammodo similis, quae ex contusione oritur. Hinc semper consultum est, vt ingruentibus, cum febre anxietatibus, animus aduertatur, an concurrat quaedam viscerum abdominis mala dispositio, quae vel ansam huic feбри dederit, vel ipsi euidenter faueat. Interdum tamen, post manifesta diaetae vitia, et ex his onerato ventriculo, cum intestinis, mox febris cum magnis anxietatibus accenditur. Lubet duos, hoc dilucidantes casus adducere. I. Lanio robustus, tempore hyberno, in itinere, ex carne suilla, et brassica muriatica, affatim comestis, a febre corripitur, cum vomitu et cephalalgia. Ob aestum sanguinis, die quinto vena secatur, et ob magnas, quas primario accusat *anxietates*, dantur aloës hepat. gr. 3. tart. vitr. gr. 15. magnesia gr. 10. vnde

D 5

post

post duo sedes aliqualis melioratio. Urina ictericorum similis erat. Vinum rhenanum tepidum, haustus quantitate datum, feliciter cum multa saburra reuomit. Datur aqua temperatum, quod rursus reuomit, quia pondus contentorum ventriculo onerato eo ipso augebatur. Hypochondria sibi quasi cum cingulo constringi querebatur; infusum Thee viridis iam cum successu bibit, vacuo nunc ventriculo, vnde nervi relaxabantur. Itaque versus noctem ipse vinum rhenanum petit, et eius uncias sex bibit cum emolumento, nocte, cum sudore somnifera, et omnium anxietatum fine: insequente statim pristina sanitate. Respectu infusi Thee, memini incubum aliquando curasse consilio, hoc infusum ad aliquot uncias ante decubitum bibendi. II. Vir robustus, quadragenarius, nauta, prandet ex iusculo carnis recentis, carne bubula salita, piscibus fumatis, anfore affato, et denique mytulis conditis. Superbibit bonum vinum, mediocriter, et cereuisiam tenuem. Elapsis quinque horis Thee bibit: verum hic adsunt mox anxietates, et pectoris oppressiones, cum tussi, qualis se adiungit saepe anxietatibus paroxysmum febrilem comitantibus. Accedit ardor et rubor faciei, cum capitis et totius corporis pruritu, insequente pulsu febrili. Rubent oculi, venae frontis inflantur, et cor agitur. Deuoluitur mox ardor et rubor in collum et pectus, mox in dorsum et brachia, et tandem in manus, cum ingenti pruritu. Eleuantur vbiq̃ue maculae, quasi urticae: descendunt hae ipsae, paulo post, ad abdo-



abdomen, femora, et pedes, mira successiue facta, neruorum motus intestini, et hinc sanguinis, in extremitatibus haerentis, et detenti communicatione. Superiores partes se nunc leuatas sentiunt. Attamen pulsus adhuc febrilis, et quidem debilis, ab affectis, sine dubio, et cordis neruis. Nulla tamen sitis; salivae enim orificia in ore manent patula. Sequitur tandem diarrhaea copiosa, quinque horarum spatio, ex qua humorum, in abdomine rebellium, euacuatione, omnium simul rebellium motuum, et excretionum periphericarum verbo, totius ingentis tumultus finis. Inculpabantur statim mytuli venenosi, qua culpa olim iam sunt notati: verum reliqui commensales, qui de illis simul ederant, optime se habebant. Praeterea idem vorax, elapsis aliquot septimanis, a prandio ex cibis oleo oliuarum conditis, carnibusque assatis, et superbibito affatim mulso, elapsis iterum aliquot horis, iisdem fere omnibus, mitius tamen, afficiebatur symptomatibus. Sola itaque ventriculi repletio, et hypochondriorum viscerum inde nata affectio, febrem hanc, cum anxietatibus generauerat exanthematicam, crassi sanguinis, in homine perfano, robusto, existente inculcata. Vasa sanguifera maiora viscerum abdominis partim mole fuerant oppressa, partim spastica constrictione affecta, cum circulationis sanguinis in partibus periphericis magna retardatione, vnde simul neruorum extremitates, in crispaturam prurientem actae fuerunt, donec opitulante affluxu seri, ad diapnoen apti, haec crispatura sublata fuit, (quemadmodum idem sub mi-

liorum

liorum excretionem contingit) vel, uti in viro robusto, magna humorum, contraria, per aluum facta excretio, spasticos motus, violenter quasi sopiuit. Quis nescit feminarum spasticas crurum molestias, comite fornicatione, quando abdominis nervi tumultum hystericum excitant? Sic etiam ingruente nostra febre miliari interdum vnus vel alterius cruris dolor praecurrit.

§. 6. Ex supra dictis patet necessitas, uti in aliis febribus malignis, ita in hac etiam, illa ponderandi symptomata, quae aperte cum morbo hypochondriaco-hysterico habet communia. Saepissime enim, his comitibus, exanthemata in peripheria excluduntur. Fere omnia, quae in hoc praesto sunt symptomata essentialia, etiam in febre miliari offendimus. Notandus itaque est *Hamiltonus*, quod ubique, vbi illa offendit, respectu theoriae huius febris, flocci habuerit, et vnice ad eliminationem sanguinis serosi, acidi, respexerit, qui aegri sitis experti fuerint, licet in multis allegatis casibus, contrarium, sitim inexplebilem adfuisse narret. Locauit tamen feliciter saepius remedia antihysterica, in decrementum huius febris. Vti fere in omnibus malignis, petechialibus, petechizantibusque, focus febris in infima corporis regione quaerendus est, ita et in plerisque miliaribus, et miliarizantibus, viscerum abdominis symbolizans morbosus status, stagnatione sanguinis fundatus reperitur, nisi aperte sint idiopathicae, secundum signa supra notata. Quemadmodum in petechizantibus vascula capillaria sub-



subcutanea nullam maculosam dant ecchymosin; ita in miliarizantibus nervorum extremitates spastica quadam tensione impediuntur habituosas pustulas protrudere. De symbolizante stagnatione sanguinis, in visceribus abdominis, in subsidium vocemus nuperum casum, licet extra febrem typicam versantem: Vir annorum quinquaginta quatuor, habitus laxioris, plethoricus, venaesectiōni addictus, tempore hyberno, ob pectoris oppressiones, aestus volaticos, et sudorem nimium insomnes trahit noctes, ut multoties, ad sudoris moderationem, inprimis, cum ipsi simul plantae pedum urerentur, de lectourgeret. Per diem commode habet, negotia obit, nec appetitu ad cibos plane caret. Alui segnitiam tamen, et urinae parvitatem incusat. Haec incommoda pilulis Becch. et Stahlii puluere antispasmi. per duo septimanas tollere frustra tentat; donec tandem haemorrhoides, quas nunquam ante expertus fuerat, erumpunt, sanguinem grumosum in magna quantitate eiaculantes, ex quibus statim noctes somniferae, aestuum volaticorum, et nocturnorum sudorum absentia, vel moderatio, urinae maior secretio, cum plenario pristinae sanitatis reditu. Attendendum hic porro est, febrem miliar. symptomaticam communiter tempore hyberno, et verno, quo posteriori et febres intermitt. grassari solent, incidere: in quibus stagnationes humorum in visceribus abdominis, ob factam copiosiore ciborum ingestionem, sub minore corporis, tempore hyemis, facto motu, minore transpiratione, generantur, se - et excretionem humo-  
rum

rum, in tantum, incomplete peraguntur, ut inde febris oriatur. Hinc fit, quod febrem intermittentem aliquando mentiatur febris miliaris, et quidem in principio, sub larua febris catarrhalis, vespera ingruentis. Verum saepissime est infida, improuiso aegrum sub insultu apoplectico iugulans, nisi paroxysmi reuersionem tempestiue impedias. Docet autem eo ipso se neruorum esse morbum. Ante hos circiter sexaginta annos, Halae, Studiosissimis Theologiae Studiosis, hypochondriis multum laborantibus, valde exitialis erat. Num inter hos fuerit ille, quem I V N C K E R V S in fine tabulae de febre miliari insidiosa morte subreptum, me latet. Idem de colica haemorrhoidali agens, dicit, illam solui *macularum scorbuticanem* prouentu, non secus ac *in malo hypochondriaco saepe contingit, et a corruptione sanguinis dependet*. Iunge maculis febrem, et erit petechialis, exanthematica periculosa. Contagiosam declarare febrem miliarem albam experientia mihi non suggessit. Moriebatur aliquando virgo quatuordecim annorum hac febre, et propinqua eius, habitus laxioris, illam decumbentem, saepe visitabat, et mox post eius obitum febre leuissima corripiebatur, simulque pauca excretionem pustularum afficiebatur; adeo, ut totus morbus potius effectus imaginationis, quam contagii esse videretur.

§. 7. Inseruiunt autem pro nostro scopo inquirendi et reliqua eminentiora symptomata examinanda, nempe *aestus volatici, pulsus sub hypo-*



*hypochondriis, suffocatio spasmodica, stupor comatosus, vigiliae, susurrus aurium, delirium, et motus convulsivi.* Aestus volatici nihil aliud sunt, quam sanguinis in visceribus abdominis stagnationes, per subinde restitutam eiusdem circulationem, interpolatae: graues autem simul sunt, quando *arteriae in hypochondriis*, et communiter in cordis scrobiculo, pulsant; indicio enim sunt, mesenterium spasmu nervorum suorum, in altum eleuatum esse, et arterias iliacas vicinas adeo compressas, vt pulsus illarum distincte sentiatur. Vti hoc graue incommodum est, ita simul terrificum, quia valde insolitum, motum cordis ibi sentire. Augetur interdum hic spasmus in tantum, vt cerebrum feriat, et sensus cum stupore comatoso obnubilet, reliquis officiis corporis naturalibus vigentibus, adeo, vt excrementa, insciis, sensu priuatis aegris excernantur. Quemadmodum autem hic status p. n. somnum naturalem euidenter impedit, ita, e contrario, dum cerebrum, tensum, et agitaturn, a forti sanguinis impulsu, toni remissione placida, somnifera, caret, *vigiliae* oriuntur pertinaces, quas saepe molestus *aurium susurrus*, ex iisdem, in capite vbiq. tensis irregulariter nervis, natus, auget. Sequitur tandem ex his *delirium*, stuporis comatosi contrarium: nam, vti in hac sanguinis abundantia p. n. lis in capite adest, ita in delirio communiter eius defectus praesto est, et tensum simul est valde systema nervosum. Vidi-  
mus hoc in cadauere capit. praeced. §. 4. et Boneti sepulchretum hunc cerebri statum, in Maniacis,

niacis, confirmat. Cum habitaculum mentis ex vna parte a sanguine stagnante prematur, ex altera parte illo careat, quæ idearum ordo in tali mala dispositione organi constare poterit, absque errore grauitè delirante? Quid mirum præterea, si nerui, partim ita tensi, partim relaxati, simulque debito nutrimento sanguinis priuati, inordinate moueantur, et nunc rigorem totius trunci corporis, in Opisthotono, ceruicem rigidissimam faciente, et per neruorum ramificationes laryngem et pharyngem, cum loquelæ et deglutitionis difficultate, constringente exerceant, nunc autem separatim membra, motibus conuulsiu, agitent. Opisthotonum comitatur communiter magna *collectio viscida in faucibus*, deglutitionem difficilem reddentis. Familiarior autem hæc est feminis, ex nexu passionis hystericae et viris, qui sunt feminei habitus.

§. 8. Haec omnia tamen adeo malignum non redderent morbi statum, nisi natura, in plerisque aegris, *magna simul laboraret debilitate*. Quam quidem mirari iniustum sit, cum partim, et primario, ex ipsis neruis, ex vitio succi, vel antecedente, vel subito alterato, debilibus, partim a *sudore effuso*, ipsam sanguinis, per aestum rarefacti, molem auferente, et per poros eliminante, oriatur: augetur eo ipso neruorum in peripheria corporis debilitas, et cutis tono priuatur iusto, ut tota marcida adpareat. Stuporem, sensus carentiam inde natam esse legimus, Cap. III. §. 4. Cum enim maxima pars sanguinis in sero  
et



et lymphæ constet, hæc vero vtræque in tenue fluidum resoluta, et per cutim et renes eiecta sint, paucò cruore cum inspissata portione lymphæ remanente, vehiculo suo priuatis, quid mirum debilitatem inde nasci ineluctabilem, et  $\tau\theta$  malignum principaliter formantem. Solennis huius febris sudor, sic affectis et laborantibus nervis, sudori fere emortuali appropinquat. Nec in aliis febribus acutis talis sudor effusus periculo caret, pulsu, nempe simul existente valde febrili: sic puella sex annorum, a variolis correpta, effusissimo videbatur diffluere sudore; insequente die vero insultu apoplectico afficiebatur, quem mox hemiplexia comitabatur: euadebat quidem feliciter a variolis, mali moris non existentibus, et etiam ab hemiplexia sanabatur, loquela tamen per totam claudicabat vitam; quam de cetero, commode, etiam mater facta, per quadraginta annos, ad vitæ finem usque trahebat. Consideranda hic venit hypochondriacorum ad sudorem procliuitas, si non per totum diem, attamen noctu, quasi hecticum: præterea volas manuum communiter habent madidas, vtrumque a debilitate nervorum, quam vappidus sanguis nutrit. Nec mireris sudorem effusum comitari *urinae parcitatem, simul indigestae*, ob functiones secretionum in visceribus abdominis, inprimis in renibus, sub hoc oeconomiae tumultu interdictas. Felicior est ille casus *Hamiltoni* puellae, quae ex multo potu aquae lactis, et iulapii tantum minxit, ut mors ex diabete metueretur; cum insecuta tamen sanitate: quam viduae, quae copiosam

E

vrinam

vrinam reddidit §. 10. cap. praec. et §. 4 et 5 cap. II. Cum, porro, sub hac neruorum debilitate, etiam specialiter cordis nerui subinde, per morulam, tono suo destituantur, *lypothymia*, symptoma, per omnia maxime terrificum, animi fugam minitans, oritur.

§. 9. Praeter haec dicta, febrim hanc fere semper comitantia symptomata, interdum adhuc alia, pro aegri individuali constitutione se iungunt. Sic aliquibus se iungit diarrhaea, vel ex bilis acredine, vel ex glandularum mesenterii comite leui inflammatione, vel ex intestinorum coniuncta atonia. Aliis aphthae oris iunguntur, cum excretionem miliari in illo, ob salivae, in qualitatem corrosivam degenerantem, exulcerascentes.

§. 10. *Frigus*, quod aegros hac febre detentos afficit leuius *externum*, in brachiis et pedibus, a vasculorum sanguinehorum capillarium, per neruorum apices factam constrictionem oriri, non dubitandum est. Quod autem *internum* atinet, terrificum magis est, et neruorum vitalem oscillationem, in truncis emergentibus, minui, corpori vero, eiusque oeconomiae, labem totalem minitari, censendum est. Quod sentiunt, interdum mulieres hystericae graue, in vertice, frigus, etiam huius §phi est, et generis.

§. 11. Consideratione autem haud leuiore, prae reliquis symptomatibus, perpendenda est illa *gelatinosa excretio*, (Cap. III. § 1 et 16.) hypochondriacis et hystericis non ignota; difficilis tamen



tamen aetiologiae phoenomenon. Cum haec duo, in citatis locis, notata subiecta apparenter non fuerint malo hypochondriaco obnoxia, adolescens nempe, et vir saluationi vacans, necesse est, neruorum mesentericorum vehementes, non dolorosos spasmos, orificia vasculorum lymphaticorum crispantes, lympham ad hanc excretionem coegisse, et in talem gelatinam coxisse, eodem, quo in hystericis et hypochondriacis modo. Mesenterium autem absque dolorifico spasmo agitari posse, ipsa non solum absque dolore coniuncta arteriarum pulsatio probat, sed et morbi spasmodico conuulsiui femellarum abunde testantur.

§. 12. Considerari etiam meretur associatio horum exanthematum miliarium, quae febribus inflammatoriis fit, pleuritidi, aliisque. Nerui, per aestum sanguinis ex solidae cuiusdam partis pleurae, vel intestinorum inflammatione, quasi cocti et marcidi redditi, facile succum suum per extremitates exhalant, et sic simul magis, per unitam illarum crispaturam, quam feri sanguinis acrimoniam, sudorem vrentem reddere valent. Euidenter hoc contingere solet in artheritide, neruorum simul pathemate, quando ipsi iungitur.

§. 13. Puerperis familiarem esse hanc febrim, non mirum sit, cum consideramus, quantum sordidorum recrementorum, tempore grauiditatis, dum purgatio menstrua intercepta est, in massa sanguinis coaceruetur, quorum non potest non quaedam copia ad neruorum succum transire. Testantur hoc aperte maculae illae cutaneae, liche-

nes dictae, aliaeque, tempore grauiditatis in cute apparentes, diuque postea superstites, illis hypochondriacorum similes: quae maculae quidem impuri sanguinis sunt soboles, attamen iudicatu facile est, per omne grauiditatis stadium, et neruorum succum ex impura sanguinis massa multum heterogenei sorbisse. Grauidarum autem valetudinis statum totum esse hypochondriacum, infarctibus viscerum abdominis, quin omnium, fulcitum, ipsa, quae patiuntur symptomata clamant. HOFMANNVS, in Consult. P. VI. D. II. monet primiparis fuisse funestiorum hanc febrim, et nec venaesectionibus, nec laxantibus, tempore grauiditatis, exhibitis potuisse praecaueri. Sunt autem primiparae teneriores, neruorum teneriorum, irritabiliorum, heterogeneum succum minus patientium, quam illae, quae iam feliciter pepererunt.

§. 14. Quando febris miliaris, post exantlatas alias malignas, insurgit, (de quibus etiam Pelargus, in suis Observationibus; et quidem quod purpura rubra frequentius illas secutae sint, quam purpura alba) licet crederet massam sanguineam, quin etiam neruorum humidum vaporosum, si quid in illo ante fuerit heterogenei, per febres praecedentes, eiecta et consumpta fuisse; tunc sub ipsa praecedente febre neruos vitium quoddam contraxisse apparet, si purpura fuerit alba. Quod, cum contingit, communiter absque periculo est: languent aegri ex debilitate neruorum, sub febricula, eiusque spasmo moderato.



§. 15. Vesiculae miliares, cum vltra biduum tales non persistunt, quin tunc albescant, et mox desquamantur, de illarum retrogressionem multa dicere non ausim. Copiosissime etiam post mortem persistisse in superficie corporis, copia nullatenus imminuta saepe visum est. Possibile quidem est, nervorum extremitates hunc liquorem vaporosum, nouiter excretum reforbere posse; interim suppressam, vel potius retentam fuisse eius excretionem firmiter credo, vbi pedum paralyses accessisse quidam obseruarunt, et diaphoreticis, et vrticationibus, vesicatoriorum non ineptis vicariis, nervis tonum reddentibus, illas sanarunt. Supra, in allegatis casibus, induriorum mutationes, imo corporis incongruas lationes, absque retrogressionem factas esse vidimus.

§. 16. Hoc momentum historicum addere liceat, et interserere, quod aegri in hac febre faciem habeant, si non pallidam, tamen paululum collabescantem, vel ad minimum, coloris naturalis maneant; indicio, vbi pallent, nervos debiles esse; vbi autem color naturalis persistat, vasa sanguifera faciei ad dilatationem a sanguine aestuoso, atonia quadam laborare. Quando autem rubor genarum per maculas distinguitur, valde incomplete vehi, et circulare sanguinem, signum est.

§. 17. Locanda denique etiam est hic memorabilis historia, quam dant Medici Londinenses, in Medical Observations et Enquir. Vol. I. de Tetano oris feminae annorum octo et viginti, caelibis, habitus tenuis, quae ante sex menses va-

riolis laborauerat. Coniunctus fuit rigor musculorum capitis, colli et dorsi, et dolore sub sterno, pro signo pathognomonico futuri tetani habito. Diebus insequentibus apparuit aspredo quaedam cutis (rash), quae die morbi decimo sexto abundanter circa collum et pectus excreta est, vrina interdum ultra viginti quatuor horas retenta. Aegra ex largo opii usu interno, et externo, addito ad sternum Galbano, in auxilium vocato balneo frequenti, in camera calida, conualuit. Simulac opiatorum usus suspensus fuit, mali deterioratio accessit. Mansit aspredo per totum morbi tempus. Pulsus fuit languidus, ideo ad febrim miliarem haec excretio numerari poterit, licet aperte nerveae fuit indolis. Balneum in vanno in ipsa febre miliari, sine noxa adhibitum lege in Cap. III. §. 17. Aspredo haec evidens fuit effectus neruorum, valido spasmoadfectorum, eo ipso succum suum, siue nutritium, siue heterogeneis mixtum elasticum, sub forma aspredinis, purpurae, miliarum, eructantium. Quis non iuste suspicaretur, tetanum oris cum aspredine infantum, quam flos cutis appellamus, eiusdem esse naturae, spasmum nempe neruorum totius systematis; cui, licet in his tenellis non audacter opio uti liceat, attamen balnea repetita egregie conuenient.

§. 18. Quas tandem ex adductis symptomatibus, ad peruestigationem causarum febris miliaris, theses hausimus stabiles, eo recidunt:  
 1) Quod systematis neruosi succo vel nutritio, vel  
 forsan



forſan humoribus vaginalibus, facta ſit intemperies, quae illud ipſum, vna cum ſanguinis maſſa accendat, et in ſuis extremitatibus, vel ſpaſtica quadam oſcillatione, vel remiſſio tono, humidum vaporoſum, veſiculas in cute formans, exhalet;

2) Quod intemperies horum humorum, etiam ex valida commotione ſyſtematis neruoſi, e. g. per iram, terrorem, motum corporis inſolitum, quin orgaſmum venereum, quemadmodum id praecedentes hiftoriae teſtantur, ſubito oriri poſſit;

3) quod ſub his omnibus, plexus meſentericus, cum turbis hypochondriacis, communiter morbi ſodalis ſit, idque eo magis, quando viſcera abdominis, iam ante ſtatus fuerint morboſi, vel focum febrilem reconditum habuerunt.

§. 19. Neruorum febrim et morbum eſſe febrim miliarem iam BRUNNERS, in Ephem. Nat. Cur. E. III. A. 7. 8. Obſerv. ſupra Cap. III. allegatis, agnouit, et quidem in ſcholio his verbis: *Non poſſum, quin aliquid de ſucco neruorum ſubolent, et in mentem veniat illorum ſententiae, qui februm ſedem ſtatuerunt in genere neruoſo. Vtrum omnes in illo hoſpitentur meum non eſt altius rimari. Certe dictarum hydatidum facies, et ipſa, quae hiſce ſuperueniunt periculofa ſymptomata, aliunde quam e maſſa ſanguinea, et arteriis promanare arguunt. Quod ſi ſtatueamus neruoſum fluidum, forte accommodatius erit, ad explicanda, quae illas comitantur ſymptomata. Et enim, cum cutis non ſit, niſi contextus fibrillarum neruearum etc. Nec ſudoris productum eſſe, inde*

E 4

enim

*enim non tantum periculum immineret etc. Nodi circa digitorum internodia nati non tantum causam dictorum symptomatum probabiliter derivatam, sed et morborum articularium, et ipsius podagrae per nervos fluere, suspicari licet: experimento, ad probandam succi neruei existentiam, haud inepto, nec incongruo. Ex eadem sane fluunt communiter causa, succi nimirum neruei intemperie arthritidis, et purpura alba: idem est communiter subiectorum habitus: adsunt communiter in arthritide hypochondriorum oppressiones, susurrus aurium, vomitus, deliria, quin lypothymiae, ubi nulla efflorescit purpura, febre, hoc modo existente miliarizante, nihilominus tamen saepe funesta. Suspensae sunt interdum in utroque morbo secretiones muci, narium, et urinae; simulac vero mucus, saepe sanguinolentus, et urina largius excernuntur, mox melior est status in morbo utroque. In virgine septendecim annorum, arthritica, cum res eo iam peruenerant, ut bene dormiret, ederet, et ambularet, fiebat tamen, sub pulsu aestuoso, excretio papularum pelluciderum, absque deterioratione status. In Eph. N. C. D. II. A. V. App. Gunteri, arthritidis allegatur iuuenis, a nimis pollutionibus nocturnis nata. Obtulit se mihi aliquando caelebs quadragenarius, fortis, laxi habitus, pollutionibus nocturnis adsuetus, iam, qui pollutiones per 6 vel 7 septimanas emanferant, fortiter arthriticus. Quid ex horum affectuum affinitate aliud arguere licet, quam causarum connexionem, quin identitatem.*



§. 20. Quoad causas procatacéticas, praeter illas, in praeced. §pho simul notatas, multae quidem apud celebriores Auctores, ex rebus non nat. producuntur, et LINDNERVS, in germanico suo Tractatu, de hoc morbo agens, illorum 23 numerat, vltima praeterea adhuc multiplici existente: nos adeo specialiter et legitime easdem accusare non valemus. Morbus est solemnior sexus feminini, et subiectorum debiliorum, laxioris habitus, cuius subiecta saepius de stupore digitorum conqueruntur, etiam absque infecta febris miliari. Ab hypochondriorum obstructionibus saepe fomentatur, et ideo puerperis, quae tempore grauiditatis multas molestias hypochondriacas tulerunt, periculosior esse solet, et sine dubio ab omni aeuo fuit, vt frustranea sit in huius febris natiuitatem inquisitio. Indos illa laborare *Hamilton* affirmat: an inquilinos, natiuos, vel aduentitios, non addit abusus rerum non natura, cibus et potus, quies et motus, excreta et retenta (excepto respectu ad hypochondriorum obstructiones, et lochia in puerperis; vel etiam motus nimii, feminae in Cap. II. notatae) ad generationem febris miliaris nil magis specificè faciunt, quam ad generationem febris intermittens, aliarumue. Praeterea, in morbo adeo acuto, brevisque periodi, et sublato, in tantum, oeconomiae animalis ordine, per easdem res naturales, melius ordinatas, sonationis primarium punctum non obtinebimus. Aeris quidem hyemalis rigida constitutio, cum perdurante serenitate, et sub mercurii in parometro eximia altitudine,

vti arthritides generat, etiam separatim febrem miliarem producere solet; an refrigerationis modo, vti communiter arthritides, vel ex speciali actione in succum nerueum, incertum est.

§. 21. Consideratis omnibus praemissis, antequam *Therapiam* aggrediamur, ita hunc affectum definimus: Milia-vesicularia, purpura alba dicta, sunt neruorum excretiones halituosae; a) quibus, si spasmus febrilis adest; b) vel ex domestica corporis causa, vel ex animi pathemate, vel ex aere succum neruorum alterante, sanguinem in visceribus coagmentans; c) et primario plexum mesentericum in tumultum agens; d) adeo, vt ex his in consensum acto paris vagi neruorum ramulo ad praecordia, anxietates, vigiliae, deliria, conuulsiones, aestus volatici, sudores, et reliqua hypochondriacis et hysteris solennia symptomata; e) generentur, pro dato neruorum robore; f) facile, vel difficulter sanabilia, quin, in hoc posteriore casu, saepissime in Apoplexiam; g) vel in partium nobiliorum; h) vel in ipsorum neruorum visibilem, aut inuisibilem necrosin, cum morte, raro sanitate, terminantia. Dilucidabo haec paucis: a) Excretiones halituosae sunt, quia vix aliquem reddunt madorem, nec, quando desquamantur. Aliter fit, quando ex arteriis in venas resorbendus excernitur in cute humor morbidus, purpuram rubram, petechias, morbillos, variolas, aliasue generans efflorescentias. Haec exanthemata enim, quia ex massa sanguinis separantur, toto coelo a purpura alba differunt, miliis



liis pellucidis, neruorum sobolibus: b) Febrilem spasmus in ipsis neruis generari, ex causa in ipsis suborta, vel, illis communicata, in propatulo est: adfuerit licet horror paruus, vel nullus; vti id e contra ad sensum continget, in febribus intermittentibus, inflammatoriis, aliisque. Agit itaque huius febris miliaris spasmus incomplete, et debiliter, sub formicatione, pectorisque oppressione, cum pulsu nihilominus insigniter febrili: tendit, et vrget simul, irregulariter, reliquos corporis, praecipue autem mesentericos neruos, quin neruorum principium, an conuulsiones, vel ad apoplexiam. Et licet interdum in corporis peripheria per maximam neruorum in extremitatibus factam extricationem, et sic humoris halituosi neruei, morbidi putati, copiosissimam euacuationem salutaris crisis speretur, attamen Cap. II. allegati casus contrarium monstrant, quia admodum probabiliter, per tantam humoris elastici euacuationem, neruorum emortualis debilitas successit. c) Coagmentari, sub hoc insidioso, clandestino spasmo febrili sanguinem in visceribus nullum sit dubium; sequuntur autem hinc secretionum et excretionum ataxiae, et has, plures sanguinis stagnationes, corporis oeconomiam grauiter laedentes. d) Plexus mesentericus inter alios valde irritabilis, maximos parit tumultus, pulsum in scrobiculo cordis, mesenterio in altum conuulso, anxietates graues, complice simul pari neruorum vago, et lypothymias excitantes. e) Quanta generetur symptomatum ceterua, quando sub hypochondriis, circa venam portae, vasa sanguini-

sanguifera lienis, et ventriculi; nec non in pancreate, mesenterio et intestinis functiones secretoriae et excretoriae debite non peraguntur, hic explanare non opus erit. f) Neruorum persistens robur essentiale est *νευρωμενον* in hoc morbo: hoc enim, si persistat, donec nerui ad regularem tonum per totum systema redierunt, morbus superabitur, fuerint vesiculae miliares multae, vel paucae, vel nullae; tummodo his absentibus, ordinaria adsint symptomata, et febris miliaris nuncupari possit. g) Praecedente vomitu, et aurium susurro, stertor apoplecticus mox insequi solet. h) Exinde saepius hepar, vel intestina maculis notata inueniuntur: adesse autem aliquando partium nobiliorum necrosin, indicatus cadaueris diutinus calor docere solet. i) Vti in Cap I. §. 11. 12. necrosis apicum neruorum adfuit visibilis, persistente, ope felicitum interuallorum, robore totius neruosi systematis: quis non videt, absentibus his faustis auxiliis, neruos in atoniam lethalem labi posse, absque mutato, in nigrum, sphaceloso colore.

§. 22. Concludendo tandem hoc caput, tres ad therapiam febris miliaris, purpurae albae, suscipiendam mihi natas esse indicationes video: 1) Spasimum febrilem sopire; 2) Vires vitae fulcire, i. e. genus neruosum roborare; 3) excretionis periphericae non primariam, pathognomoniam tamen, habere rationem, quia haec a circumstantiis antecedentibus dependet, et quia, interdum, abundantissimam, sanitati non salutiferam,



ram, mediocrem autem, vel plane violenta manu obtritam. (Cap. III. §. 16.), vel in miliarizante nullam, redintegrationi sanitatis non contrariam vidisse vidimus. Momentum, in omnibus fere exanthematicis obseruandum, mihiq;e, inprimis, in febribus petechialibus solenne, quod petechiarum excretionis non primaria habeatur ratio, sed sustentatio toni systematis neruosi, per analeptica antipyretica, et frictiones. Frictione haerens in extremitatibus vasculorum sanguis morbidus, partim attenuatus sub feri forma per cutim transit, partim ad massam redit, absque periculo. Nam, si vires vitae per neruos frictione modesta roboratos, et per reliqua interna subsidia subleuantur, extrauasatus et corruptus in peripheria sanguis per debita organa eliminabitur: deficientibus autem vitae viribus, stagnans, vti in peripheria, ita in maioribus ramis sanguis, deleterium dabit finem. In ipsis variolis aliquando modesta abdominis et crurum frictio, (immodesta coagmentabit) dissipabit materiam excernendam, vt attenuata per cutim et renes transeat. Valet et haec frictrix methodus, ad sufflaminandum sudorem nimium, prae refrigeratione, dum cutis, ipsa mediante frictione firmatur, et pororum ostia coarctantur. Temeraria sane est lotrix illa methodus cum frigida, quam praedicatam legimus in Appendice Vol X. Eph. Nat. Cur. Milia, venenum vehemens putatum, repelluntur cum sero feruido subcutaneo; licet fatendum sit, inde aestuantes a sanguine neruos refocillari, et roborari. Quando iam, feliciter, sub tali lotionem, viscerum abdomi-

nis

nis viae secretoriae peruiiae et patulae sunt, ad renales excretiones promouendas, forsan sudor, quem tamen frigida aqua in cute fundere dicitur, non bene successerit, res salutarem finem habere poterit. Quando autem haec feri, a frigore repulsi, copia subito e massa sanguinis ad excretoria organa non demandabitur, facile ad cerebrum verget, et ad funestum exitum. Prouocare poterunt hi experimentatores, ad casus quosdam, referentes, aegros quosdam morbo acuto decumbentes, se custodibus subtraxisse, et in flumen commisisse, eodemque modo morbum superasse: verum, pauci sane erunt, qui hunc lapidem lydiū roboris naturae sustinebunt. Hydrophobiae similem esse hunc morbum vult ALLIONVS: (Comment. de rebus etc. Vol. VIII. p. 606.) cui adfectui quidem immersio talis in aquas muraticas maris, vel alis, ad prouocandum largum urinae profluuium conuenire solet. Interim symptomata hydrophobica, illis, febris miliaris conuenientia, nunquam obseruauī: ideoque similitudinem talem admittere nequeo.

---

## CAPVT V.

### *De natura febris miliaribus ex symptomatibus eruta.*

#### §. I.

**T**riplicem suppetiit mihi praecedens caput, ad sanandam hanc febrem, indicationem, nempe: 1) spasmum febrilem sopire; 2) vires vitae



vitae fulcire; 3) excretionis periphericae non primariam habere rationem. Vt priori indicationi satisfiat, improba opus erit opera. Oritur enim hic spasmus febrilis, et fouetur, vel ab intemperie ipsius succi neruei orta, vel communicata, vel a violenta commotione fibrarum systematis nervosi propriarum, in suum succum, et inde in sanguinem aestuantem, ex commotione animi, ira, terrore, venere etc. secundum historias Cap. III. Intemperiei vocabulo, modesto antiquorum ignorantiae peplo, vtor, quando incerta est falsa pro veris et certis vendere noluerunt. Vana, et incerta, de mutata temperiei natura sunt iudicia: nunc enim sulphure quodam volatili laborare iudicatur, nunc acido alio volatili, nunc alcali volatili. Quale iam alterans, vel sopiens, sub hanc incertitudine adhibendum erit? Valet quidem contra febriles spasmos, ex orgasmo sanguinis natos, quin etiam quodam modo, contra spasmos febriles, ex intemperie nervorum orgasmica ortos, nitrum, inualidum autem esse, in morbis, sic dictis malignis, ad febrilem spasmum sopiendum, comperimus: imo, quando eius maiorem quantitatem, ad hunc finem necessariam esse iudicamus, et propinamus, debilitatem nervorum ventriculi, et intestinorum, et sic reliquorum consentientium, ex hoc nasci experimur. Admittamus nihilominus prouidum, et attentum eius usum, inprimis tartari vitriolati Tach. tertia parte nupti, quo huius aperitiua amaritie, nervis non ingrata, intimius in sanguinem introducatur, et sanguinis orgasmum sopiendo, spasmo detentos

nervos

neruos leniat, et simul, quod primarium est, diuresin feliciter promoueat. An obsorbentia ipsi iungenda sint, dubitandum; nisi aperta aciditas in ventriculo obseruetur. *Hamilton*, de febre miliari agens, totus est in exhibitione pulueris echelis cancerorum, quia serum sanguinis acidum pro morbi causa habet: nullibi autem sufficienter probat. Si ad gustum tollendum, nitro, praeter tartari vitriolatum, addere placet, sit cascarillae cortex, ob eius virtutem sedatiuam. Quemadmodum enim nitrum humori organico frenum iniicit, ita hic cortex fibras agitas, pro virili, sopit, inque hoc, cum aliis eiusmodi et volentioris naturae, notis antispasmodicis, asa foetida, castoreo, Galbano, et fortissimo illo neruino, opio, conuenit.

§. 2. Stupefacere, dices, neruos, est illorum virtus. Et est. Stupefaciendo autem impeditur illa frictio fibrarum exaestuans: moderate, et provide, vti decet, illas stupefaciendo, locus tempus datur humori infenso eliminandi, et per circulationem massae sanguineae, et restitutas, sub hac morula, secretiones, et excretiones, extra corpus emigrandi. Quis enim medicinam facientium nescit, post opiatorum, camphora subinde nuptorum, congruum, bene locatum vsum, sopiri cordis praecipitem febrilem motum, et fieri moderatiorem, dum cordis, et reliquorum neruorum tensio et spasmus, ex illis infringitur, eoque ipso sanguini, in parua copia, per cor, spasmo constrictum, et coarctatas arterias meanti, liberior



liberior paratur via. Soluta enim veris, modestis antispasmodicis, cordis, et arteriarum constrictione, maior sanguinis copia cordi traditur, pulsusque fit plenior et moderatior: sic etiam venoso systemati copia sanguinis maior redditur, quo officina corporis colatoria secretiones et excretiones vtilium retinendorum, et noxiorum reiciendorum bene administretur. Vbi enim pulsus celer et frequens febrilis est, cum totius corporis morbido statu, (ex motu enim corporis, cum aucta respiratione, etiam exsurgit pulsus celer et frequens) ibi cor spasmo est adfectum; et quo exilior pulsus, et maior penuria sanguinis cor permeantis.

§. 3. Vt autem antispasmodicorum virtuti nihil obftet, opus erit, vt primarum viarum, ab excrementis crassioribus, ibi forsan coaceruatis, fiat euacuatio, et succedens abstersio. Si itaque aegri in morbi principio vomituriunt, urgente saburra ventriculi, radicis ipecac. gr. 6 vel 7, cum anatica portione tartari vitr. dentur; exceptis puerperis, quibus talis commotio non conuenit. Si a tali parca dosi vomitus non successerit, radix suae virtuti diaphoreticae relinquenda est. In finem vomitorii etiam bene quadrat sulphur antim. aur. tertiae praecipitat. determinata dosi exhibitum. Persistenti autem vomitioni aqua menthae sola, vel essentia castorei, vel grano the-riacae celestis animata detur: vel haustulus vini rhenani saccharatur, cum cinamomi puluer. et croci ana gr. quinque, cum saccharo contritis.

Quadrat idem exhibere post euacuatam per vomitum saburram.

§. 4. Vomituritione absente, vel aliis causis hanc euacuationem anotericam dissuadentibus, nihilominus intestinorum per clyisma emolliens et leniter stimulans fiat euacuatio; postea vero nervis placandis intendendus est labor, et praeoccupanda illorum pertinacia spasmodica. Insuper in hunc finem pilulae sequentes: Rec. pulvis castorei, asae foet. ana gr. vi. al. hepat. gr. 3. moschi or. (ad consilium *Allionis*) gr. iij. M. fiant, cum extr. cascar. inde pilulae octo, de quibus primo biduo, sub nocte, quatuor capiantur. Turbas spasmodicas abdominis mitigans est medicina, intestina simul interdum abstergens, ideo etiam in progressu morbi innocua, Cap. III. §. ii. aeger fortioribus euacuatus fuit purgantibus, sed debilis pro tempore factus; id quod in hoc morbo, si in quo alio, periculosum esse iudico. Roborant simul harum pilularum species genus nervosum, et quadrant etiam feminis turbas hystericas in hoc morbo patientibus, nec non viris, eodem patientibus mala (Cap. III. §. 4.) *Hamilton* talibus usus est feliciter in feminis febre miliari laborantibus; adscripsit autem illorum bonum effectum aliis simul datis remediis; quin in angustiis, et consilii inops subinde haerens, ad omnium nauseosissimam medicinam antihystericam, stercoris equini succum descendit, (Cap. II. §. 8.) nervinum efficacissimum. Respexit quidem ad lochiorum purgamentum; verum usitatissimum etiam est mulierum euporiston in turbis hystericis. Vt autem  
omni



omni modo pax et robur in systemate nervoso conseruetur, fiat massula ex sequentibus: Recip. asae foet. drachm. vnam et semis, G. Galbani drachm. semis, Camph. gr. v. ol. succ. gutt. 4. laud. opiat. in liquore nitri fixi soluti gr. i. misc. et ope lintei cuius manus carpo alligetur. Hoc modo oeconomia corporis ad toleranda, quin ad praeccludenda fontica symptomata erit praeparata. Odorifera omnia sunt neruina, pro nervorum statu, nunc suaueolentia, nunc foetida, quae tamen pro tempore habentur dulcia, conf. Cap. II. §. II.

§. 5. Oppressionibus pectoris praesentibus, cum pulsu febrili contracto, vesiculas miliares praedicentibus, nervi thoracis, ad imitationem Medicorum Polonorum, in Primitiis, vapore succini, linteo excepto, leui frictione roborentur: non praecise, ad vesicularum prouocationem, sed ad nervos, spasmodica quadam tensione, ad insequentem forsan atoniam usque laborantes, roborandos; exsudent inde vaporem miliarem, vel non exsudent, tono modo naturali reddantur, et temperiei naturali succi neruci, cum moderatione febris. Infuso vtatur aeger, aquoso, ex cort. cascarillae et rad. valer. ana concisis, leuiter tincto, ad uncias tres, ter in die, cum saccharo. Bis vel ter in die, instillantur guttae viginti spir. bezoard. Buffi, vel ess. castor. concentratae. Quibus aqua hirundinum cum castoreo dulce sapit, ad minimum non aduersum, illi illa sola ad unciam semis, vel infuso mixta vtantur. Infuso lapidis hystricis, famosi Piedro del Porco, a diuo Petro magno

Russorum, Amstelodami caro emti, bis, ex iussu, puerperis, purpura alba laborantibus, frustra dedi. Falso praeiudicio nititur eius, a priori encomium. Tepidum omne bibatur, quin frigidulum, pro aegri placito; nec sudorem pellere tentetur, nisi aegro, ob perceptum inde fructum monente. Sufficit levis corporis mador, nisi natura ipsa criticum, cum symptomatum alleviatione, agat sudorem. In tantum autem reiicere regimen diaphoreticum non sum author, vti in casibus allegatis Medicorum Polon. legimus, et reiectis stragulis, diuresin, violenta encheiresi extorquere. Habeat haec methodus morbum per vesicam urinariam euacuandi felicem semper sortem! Si ipsa natura per potum copiosum, adaequatum, serum feruidum factum ab vrente succo nerueo, per renes expellit, tunc tutius res agitur. Adaequatus autem potus est gratus, ex vino, cum sufficiente quantitate sacchari, parca tamen, edulcoratus, et ad duas tertias lymphatus. Medici Poloni decoctum auenaceum cum nitro et melle frigidum bibendum dederunt: interim simul pectus aqua calida lauarunt, methodo, e diametro contraria *Hahnianae*, Cap. IV. §. 22. ex Eph. Nat. Cur. allegatae. Medici Poloni, citato loco fatenter, non omnes aegros sua methodo conualluisse, et idem dicendum erit de methodo psychrolusica. Et quae methodus gloriabitur omnes sanasse morbos? Illa sane merebitur inseri *Valentinianae Praxi Infallibili*, ante annos circiter quadraginta, in quarta forma editae. Nec serum lactis, coagulo paratum, vel cremore tartari, vel  
vino



vino mosellano, postea etiam paululum lymphatum, pro potu reprobandum est, frigidum, si placet, bibendum, nec parce, modo haustibus modicis. Frigidus potus citius petit renes, quam calidus, et maiore bibi potest quantitate, scopo dilutionis, et defecationis sanguinis. Sane, quae quatuor horis octo mensuras aquae frigidissimae bibit, et per vrinam reddidit, viscera optime diluta habuit aegra. Vide supra. Aegris, a spasmo mesenterico liberis etiam in hunc diureseos finem poterunt dari acida vegetabilia, citri, berberum etc. in potu auenaceo, hordeaceo, cum rad. scorzon. c. c. Potum frigidulum etiam nostris aegris, cum bono successu exhibitum fuisse, supra exhibuimus, ad euphoriam aegrorum. Consentimus etiam cum Celeb. *Pomino*, in infundendis clysmatibus leuiter frigidulis; frigidam aquam, parcis dosibus, interne sumtam minoris periculi esse, quam externe largiter applicatam. Prostant de potu frigido in febribus, apud scriptores, encomia superlatiua multa. Anno 1724. Anglus quidam *Hancock*, frigidam, in opusculo suo, *febrifugum magnum*, salutauit, et non solum omnibus febribus malignis, sed et ipsi pesti frigidam obuiam ponendam esse putauit. Non insolitum esse hodiernum frigidae usum in febribus malignis, indicant Comment. Lips. de rebus, Vol. I. p. 240. ex italico quodam opusculo, nempe aquam frigidam loco sudoriferorum, et loco puluerum, ventriculum incrustantium, in febribus petechialibus esse dandam. Ingeratur itaque frigida paruis iteratis haustibus, vel alius tenuis palato et ventri-

culo gratus potus frigidiusculus, tantum, quantum renes parua mora reddunt. Solet enim frigidus potus facilius renes petere, quam calidus sanguinem ad sudorem lente exagitans; omnibus tamen circumstantiis et symptomatibus bene pensitatis.

§. 6. Sanguinis euacuationes communiter efficaces habentur ad febrilem infringendum spasmum, et reuera saepius id praestant, ubi plethora aegros occupat, et sanguis valde exaestuatur, vel in viscere quodam stagnat, inflammationem excitaturus. Euacuentur itaque primis morbi diebus, unciae aliquot, numero septem vel octo, habito respectu aetatis, et subiecti, licet miliorum certo adfuturorum adsint signa pathognomonica, vel prima vestigia. Vetaret quidem venaesectiorem observatio, in *Home medical Facts, and Experiments* reperibilis, quod, quibus secta fuit vena in febre miliari, Gandavi grassante, media hyeme, ne virus euaserit, licet vesicatoria et vinum, primaria roborantia fuerint adhibita; verum, si inflammatum adest viscus, eius ratio primaria est habenda, si non, modica venaesectio locum habebit. Attendendum enim, si in qua febre, ad virium naturae conservationem, quia nervi laborant, quibus pabulum nullatenus surripiendum. Forsan repetitas adhibuerunt, Gandavi, venaesectiões. Forsan vinum liberaliter est datum. Insidiosa est febris. Vti in omni proposito opportunitas est observanda, ita et hic circa sanguinis euacuationes agendum, nec iis pertinaciter insistendum:



stendum: vidimus enim per illas repetitas, Cap. III. §. 6. a sanguine totum spoliatum corpus; et *Bonetus*, in Sepulchreto, de febribus continuis agens, casum similem, de principe iuvene, per sanguinis varias euacuationes, in febre maligna factas, adeo euacuato, vt nihil eius in corpore reslitterit. Cum febres tales malignae, sub praesente anorexia, sanguinem, et inde neruos, nutriri et refici non permittant, sudor praeterea, et vrina eius quantitatem perpetuo minuante, quid mirum, si coniunctae eius, per artem factae, euacuationes, illum totum exhauriant. Si haemorrhoidibus laborarunt aegri, ano adplicandae sunt hirudines, quin, absque euidenti moliminum haemorrhoidalium concursu vtiliter applicabuntur, in omnibus febribus malignis, ob praesumptam sanguinis, in visceribus abdominis stagnationem, et ad imitationem vsus celebris illarum in Polonia, (conf. *Primitias Med. P.*) in hisce febb. Profunt equidem in aestibus volaticis hysteriis, aliquando sanguinis ventilationes, et legimus in *Ephem. Nat. Cur. D. III. A. 4. Obs. 73.* aestus volaticos, praecordiorum dolores, et anxietates, quasi mortiferas, sola venaesectioe fuisse curatas, additis, pro re nata, iusculis vinosis. Vide *Additam. ad §. 92.* Puerperis, lochiis deficientibus, praesente iam excretionem miliorum, venaesectio in pede conuenit, absque diutina tamen immersione pedum in calida aqua, quia haec vires frangere valet. Et hoc modo, generaliter, secundum primam indicationem, febris miliaris obuiam itum esse puto. Cui, si satisfactum est, manus mox datura est victoria.

§. 7. Quod secundam attinet indicationem, quae vires vitae fulcire, i. e. genus neruosum roborare docet, illa omni modo et via, quibus animae prudenter gratificare valemus, peragenda est, exhibendo, omni sensorio reficientia, et recreantia quaeuis, primario autem, quae per saporem gustumque agunt, et quae per ventriculum, non solum ad cordis neruos, sed ad ipsum cerebrum virtutes suas ferunt, inter quae primarium est vinum, palato gratum, non oligophorum, sed *ro C. O. S.* praegnans, dosi tamen medica semper propinatum, vinum rhenanum, virtute diuretica simul praestans. In eundem roborandi finem commendatus sit potus frigidulus, gratus, neruos demulcens, et illos suauiter simul tendens, ad aegri prudentis, et sibi temperantis placitum. Quid notius, ad potus frigidi robur probandum, quam vulgi experimentum, quo, dum a lypothymia corripuntur, hanc haustu frigidae reprimunt: taceo, frigidae adspersionem in faciem, vel, quod efficacius agit, ad guttur, in lypothymiis, subito fructuosam. Certe, si in hac febre lypothymia accederet aegro, loco psychrolusiae vniuersalis, haec specialis ad guttur indemnis erit. Serum lactis cum vino rhenano paratum ad aliquot uncias per diem, repetito, bibere licebit. Si aeger cibum appetit, panis biscoctus, sapidus, odoratus conuenit, et poma fragrantia, matura. Si ex animalibus, et, *si ventriculi digestionem fidere licet*; paucum carnis vitulinae succulenter assatae, brodium aqua temperatum conueniret, praepullis gallinaceis, et auibus syluestribus assatis, exsuccis.



succis. Paruum volatile, quod in carne succulenta haeret, vti liquori gastrico conueniens, ita sanguini pabulum nerueum communicat. Parcissimo tamen vsu, et iunctis acidulis. Iuscula, si appetant aegri, tenuia sint, pinguedine carentia, succo citri, berberum, vino acido parum gratificata. Valet muria brassicae: Betae rubrae; aceto conditae. Non absque ratione commendatur aegris, contra vigilias pertinaces, cerebrum, vel vitulinum, vel suillum, vel ouillum, leuiter tortum, delibando quasi, comedere; nam, quemadmodum emulsiones seminum, feliciter interdum vigiliis opponuntur, ita, haec cerebra, emulsiua quasi sua substantia neruos etiam demulcent. Potus basis sit decoctum hordei, vel auenae, praeceteris diureticae, vel orizae, pane sapido, vino, succis acidulis conditum. Cereuisia tenuis, non lupulata, acidula, auenacea. Nec serum lactis dulce, coagulo vitulino, vel ventriculo secundo, reticulo, praeparato, paratum, et sic naturale reprobandum est; melius enim est tale, quam illud, quod per diutinam coctionem lactis et euaporationem in caseosam substantiam, et adfusam postea aquam paratur, vtpote non serum lactis, sed aquam, substantiamque caseosam lactis continens. Quod acido citri, vel cremore tartari paratur, verum etiam est lactis serum, et posterius quidem, cum cremore paratum, scopo diureseos, omnia antecellit: prius autem, coagulo vitulino paratum, simul nutriens, conualescentibus optimum. Valent porro quaeuis virium fulcimenta ex fragrantibus quibusuis, quin pro idiosyncrasia aegri,

ex foetidis, et male odoris, utique neruinis. Spiritus salis ammon. vrinofus, pro odoratu diligenti locum habet. Valent, quae visui sunt iucunda, quae aures demulcent. Valent denique leues corporis frictiones: blandiloquia, consolationes, et omnia, quae animum erigere, et somnum reficientem, vigoris vitae, et recreatae naturae testem inducere valent. Sunt, (*Ranchinus*, in Praef. Tractatus de Senio, allegatus) qui in virium defectu, testiculis, imo feminali, roborantia applicare suadent, argumentis non spernendis; itaque illis viam hanc, vel siccam, vel humidam praecludere nolumus.

§. 8. Tertia indicatio erat, excretionis periphericae non primariam esse habendam rationem. Haec negatio non iubet nullam excretionis periphericae esse habendam rationem, sed admittit aliquam, et quidem nullatenus negligentem. Nata est haec indicatio ex observationibus, quae docuerunt miliorum copiosissimam excretionem, eodem modo, quo variolarum, petechiarum, morbillorum carbunculorum copiosa excretio funesta esse solet, funestam fuisse, quia vires vitae tolerandis istis excretionibus, donec resoluantur, vel suppurentur, impares sunt. Vesiculae miliares, etiam si ceu symptoma considerandae veniunt, tamen illarum, ceu symptomatis magni, statum neruorum alteratum indicantis, et morbum duplicatum, quando et ipsa febris, pro nostra disquisitione symptomatica est, et visceris alicuius inflammatoriae iuncta, magna habenda ratio.



ratio. Datur praeterea febris, cum typo miliaris agens, absque excretionem miliarum, ideoque miliarizans dicenda: uti datur febris petechialis, absque petechiis, ob typum tamen petechizans dicenda. Interim in utraque animus ad excretionem exanthematum est aduertendus, ad nervorum et morbi statum cognoscendum, et quidem magis in nostra febre nervosa, ceu in parte solida magis fontica haerens, quam in petechiali, quae in parte fluida, facilius resolubili, sanguine, nidulatur. Medici Poloni, in suis Primitiis, et casibus supra allegatis, excretionis periphericae superfluam pro nostra opinione, habuerunt rationem, dum operosa frictione, teste §. 14. Cap. III. *tres septimanas, quotidie per integram horam, ter in die*, viduam fricarunt, ad purpuram vesicalem euocandam, auxiliante vapore succini, laneo panno excepto. Fallaciam autem causae non causae adfuisse autumo: nam, qui secutus est melior morbus status, et aegrae melioratio, plus frictioni, et fumo succini, quibus nervi roborati sunt, et sanguis periphericus in circulum reductus est, attribuo, quam excretioni miliari. Testantur interim sic producta milia, et insequens leuior aegri status, de nervorum robore. Tantam vero habere excretionis negligentiam, quae stragula removere, et aërem frigidum in conclaue admittere iubet, exercere non licet. Casus Cap. II. §. 6. de tali negligentia fatali testatur, ex *Sydenhamii*, solidis, caste tamen applicandis, monitis, male applicatis, forsan nata; et forsan tanto magis talis, quia *Hamilton*, ubique, contra sui compatriotae

patriotae monita, omnem laborem in sudoriferis posuit. Medium tenere beati. Putridi aëris conclavis exclusio necessaria est, in quo aeger decumbit; nec ille adstantium copia, nimioque calore est exaestuandus, vel impuritatibus deprauandus. Stragulis aegri tegendi sunt, ad colorem naturalem, et lenem diapnoen seruandam, non autem ad illos suffocandos. Facilius, et felicius, potum frigidulum ferunt aegri sufficienter tecti, quam nimis leuiter tecti. Omnem respectum ad diapnoen reiicere, et peripheriam corporis frigida aqua constringere, non sum imitator, nec commendator, donec experientia omnem pristinam methodum inanem declamet. Fallax sit tantundem experimentum: et, si inualescit haec frigida methodus feliciter, vnice neruorum ad actiones vitales conseruandas restauratio habeatur.

§. 9. His praestauratis, viam regiam curae strata esse puto. Cum autem graua huius morbi symptomata Medicum facile in aua ducere possunt, necessarium duco primaria illorum allegare, et quomodo illis obuiam eundum sit, ex casibus praecedentibus docere: Sunt autem  
1) *Pectoris oppressiones*, cum pulsantibus in cordis scrobiculo, vel in hypochondriis, arteriis: quae, si insurgunt, clyster iniiciatur, octo vnciarum ex infuso cort. cascar. et rad. valer. paratus, subtepidus, quin frigidulus, acuatus nitri depurati drachma semis. Crura fricentur a pedibus ad genua vsque; et vesicatoria ponantur in fine musculorum gastrocnemiorum, vel ad femora interna,



interna, ad methodum *Hamiltoni*: plantis pedum autem emplastrum de pice supplantetur. His praemissis, pectus pannis laneis, fumo succini imbutis, ad methodum Medic. Pol. in Primitiis supra allegatis, maxime circa costas, ob neruos intercostales, fricetur, eleuentur inde pustulae, vel non eleuentur, modo spasmus, pectus constringens reprimatur, et sopiatur. Praeterea scrobiculo cordis linteum duplicatum spiritu frumenti, vel vini madidum indatur; ex quo aliquando femina hysterica, non tamen, nec puerpera, nec febre miliari, ob multa huic feбри propria symptomata tamen, certo miliarizante laborans, tantum contra hunc spasmus mesentericum, arterias, cum tumore scrobiculi interdum, eleuantem, proficiebat, vt sibi totum pectus spiritu frumenti calido obtegi faceret, cum mox iniecuta sanitate. Facile permissem totum eius corpus, methodo polonica, linteo, tali spiritu grauido inuolui: quemadmodum *Primitiae*, saepius allegatae, illud ad sudoris euocationem commendant: laneum enim indusium, ex anglico panno, Flanel dicto, quo induta erat, cutis poros magis claudere videbatur. 2) *Faucium strangulatio*, cum deglutiendi, et loquendi impotentia, si cum coacervatione viscerum, per oesophagum simul ascendentis contingit, per rhabarb. gr. 10 vel 12, cum liquore nitri fixi, gutt. totidem, seu salis tartari gr. 3 vel 4. leuatur. Hypochondriorum autem simul fiat ligatio, in vtroque sexu. 3) *Lypothymiae* si insurgunt, praeuiis oscitationibus, itidem hypochondria constringentur. Alius, si vltra  
qua-

quatuor et viginti horas clausa fuit, clystere, granis aliquot asae foetidae, cum aceto solutae, condito, educenda est. Reuocata, per odora empyreumatica, adusta varia, vel per spiritum salis ammoniaci anima, sustentetur grato odore, quem vinum rhenanum vinosum, cum spiritu salis dulci mixtum, vel, quem panis familiaricus, niger, acidulus, cum spiritu quodam aromatico, vitae balsamo suaue olentissimo, irroratus praebet. Omnis moueatur lapis, ne debilitas praesens, lypothymiis augeatur. Ideo perpetuo in manibus habeant vitrum spiritu salis ammon. ad tertiam partem repletum, quia ex superstite vacuo, altius in nares euolat, quam e vitro toto repleto. Vinum non oligophorum, sed probum, vinosum, lymphatum, et saccharatum, in iusculi forma, interdum praebetur. 4) *Vigiliae*, si perdurant, potus, versus noctem paratus non sit totus aquosus, sed vini rhenani, vel canariensis probi, vnciae 2 vel 3 librae vini addantur, et aquae menthae vnciae 4 vel 5, vel aquae cinn. s. v. vncia vna. Aqua menthae, ex oleo suo parumper albicans, blanda sua aromatica amaritie, soporifera est. Caput radatur super futuram coronariam, et in occipite, et denudata loca, oleo bono populeo, tribus vicibus per diem, calide fricentur: cauendo, ne multum erigantur aegri sub vnctione. Plantae pedum, eodem oleo blande fricentur. Vesicatorium nuchae imponatur, non, vt putares, ad superfluos humores e cerebro euacuandos, sed, vt calore, quem per inflammationem cutis, toti encephalo communicat, somnus inuitetur, quemadmodum id,



id, non vna vice, in ipsis deliriis, factum esse obseruauit. *Hamilton* contra inquietudines, vesicatorium pone aures ponere iubet, quae loca magis incommoda esse solent, ob situm in lateribus prohibitum. Facile autem cum illo conuenies, vesicatoria, omnia remedia, spirituum commotionem sedantia, et somnum conciliantia superare. Licet tantus vesicatoriorum Panegyrista haberi nolim, attamen, cumulum elogiorum, quibus ab aliis Practicis cumulantur, reticere mihi non licet. Celebris Viennensium Practicus, *Storckius*, praeter mitigationem deliriorum, et suris, quandoque etiam humeris, et nuchae applicatis, mentis serenitatem reparatam attribuit. Chirurgus quidam Anglus, *Ingram*, qui magnam pestem constantinopolitanam, anni 1751 anglico idiomate descripsit, vesicatoria spiritus animales excitare, humores circumagere, circulationem sanguinis promouere, obstructions vasorum capillarium referare, et sudorem, vrinamque pellere asseuerat. Sufficit mihi, *interdum*, ceruici applicitum, obtenta sopitio deliriorum, et vigiliarum, meo iudicio, modo supradicto, conf. *Commerc. liter. Norimbergense*, A. 1741. p. 355. vbi lis mota circa vsum vesicatoriorum, in febribus exanthematicis, nuchae applicatorum, ad agrypniam leuandam, cum eorum vsus confirmatione. Sub vesicatoriorum vsu, commodè, versus noctem, granum dimidium laud. opiat, cum camphorae gr. i. cort. cascarillae gr. io. aegro dentur, et pro aetate, et circumstantiis, idem puluis post tres vel quatuor horas repetatur, imò, absente forte siti, pulueri gutta

gutta vna ol. absinthii destill. veri, vel myrrhae gr. 3. addantur: balsamica enim amarities, vti roborat, ita sopit neruos. Placat inquietudines etiam infusum fl. papav. errat. (Cap. III. §. II.) et recordor, me olim acute febricitanti, infusum herbae rosmar. palustris, narcoticae, leuissime tinctum, ad blandissimum sudorem, cum febris magna mitigatione, exhibuisse. 5) *Pulsus articularum, in cordis scrobiculo, vel in hypochondriis*, vigilias nutriunt, et anxietates augment. Spasmi mesenterici actio est, vicinas arterias in altum euehens, et vitalibus corporis functionibus, perniciosae confusione tradens, quin ipsum cerebrum ad deliria disponens. Iunguntur communiter aestus volatici, et brachiorum ardores, miliorum praecursores. Quicquid praeter leues alui subductiones et clysteres (§. 9.) frigidulos, sex vel septem vnciarum, ad circulationem sanguinis, in abdominis visceribus, aequalem reddendam, contra hos aestus, spasmo velificantes agere licet, id tartaro vitr. tach. cum nitri aliquot granis nupto, agendum, vt horum refrigerio, sanguis aestuans, in retardata circulatione, spasmi ipsius matre, temperetur. Ex his spasimis saepe dolores abdominis ad totum corpus vagantes, vti supra in femina illa, trigeminorum matre, ad scapulas vsque peruagantes fuere. Si aestus volatici enormes sunt, cum anxietatibus mortiferis, vide, an vsum habeat, pro tempore, venaesectionis, cuius §. 6. mentio facta, vel iuscula vinosa, spasmum dissipantia: vel, an aegris, anxie frigidam aquam postulantibus, contra aestus concedendus sit: femina enim,



enim, cuius in principio huius §phi meminimus, quae spiritu vini calido, in paroxysmo febrili hysterico, pectus sibi lauari iubebat, cum multo emolumento, largum haustum frigidae, quam adstantes ipsi cochleatim porrigere intendebant, ex arrepto cantharo bibebat, et eo ipso simul leues quosdam motus conuulsuos residuos compescebat. Prater applicatum in cordis scrobiculo, vini vel frumenti spiritum, asae foet. gr. duo cum theriacae coelestis gr. vnico, contra hunc spasmus valent. 6) *Deliria* mitigantur iisdem remediis, quibus vigiliae sopiuntur: aucta simul dosi potus vinosi, roborantis, qui meandros cerebri halitu suo demulceat, et lambat, vt a tensione sua remittat, et somnolentiae locum cedat, dum mediante modico sanguinis adfluxu, vasorum inanitionem, deliria augentem, praecauet. vide Cap. III. §. 6. Addantur insuper frontalia, et emplastra ad tempora. Plantis pedum discissae columbae adplicentur, et ad *Hamiltoni* praescriptum vesicatoria maiora, inter scapulas et brachia, et femora interna applicentur. (De corio aegri agitur, attamen ad eius salutem, modo non sit immoriger.) 7) *Conuulsiones* si apparent, non solum in nucha, et ad musculos gastroenemios, quin simul in mox nominatis locis, vesicatoria locentur, quia seuerius cum illis agendum: plantis pedum vero emplastrum de Galbano, cum picis quarta parte; vel fermentum panis secalini, cum quarta parte salis mixtum adplicetur, quo horum neruorum irritatione, reliquorum systema ab irregulari motu reuocetur, et ad naturale aequi-

librium reducatur. Quaeuis itaque per irritationem nervos reliquos indirecte sopientia, hic ad fulcimenta virium vitae numerari possunt. Pauores saepe, in hac febre, praecedunt convulsiones, uti id in infantibus solennius contingit, sed et interdum sequuntur sopitas; tunc fumo succini, bis in die, caput perfumetur: quo mediante etiam interdum molestus ille aurium susurrus mitigatur. Praesentibus autem convulsionibus, vel illis interpellantibus, artus essentia succini saturata, ad *Hamiltoni* methodum, vel oleo amygdalarum, cui sexta pars Petrolei admixta est, illinantur. De hoc, nec non de oleo succini guttae duae volis manuum, et soleis pedum salutariter adfricabuntur. Applicentur praeterea clysmata lactea, tepida, cum castorei et asae foetidae, aceto resolutorum ana, scrupulo. Saccharum saturni, in supra recensitis casibus, in auxilium vocatum fuisse, miraberis lector, et nervinum habitum; et nervinum illud tale esse, quale omne venenum, forsan dices. Recte, si illo abutimur, nec cum illo eadem agimus cautione et prudentia, quali hodie, plures Medici, (et Iudaei in Ukraina, iam ante seculum) cum fortissimo veneno, mercurio corrosivo, contra morbum venereum egerunt, (de quo vide etiam *Commercium* lit. Norimb. 1741. p. 6.) et hocienum *Allionus* contra purpuram mil. suadet. Nervos figulorum, et qui cum ipsis viuunt, canum et felium, ab inhausta atmosphaera, per lythargyrii vaporem, saturnina, paralyfin pati immedicabilem, notum est: taceo vinum lythargyrifatum, et butyrum in plumbo adserua-



adseruatum, quod secundum Ephem. Nat. Cur. Vol. VII. monachis colicam lethalem peperit. Verum, sacch. saturni duo, vel tria, quin quatuor grana, semel in die data, non ita violenter agunt, quam duo grana mercurii corrosiui, per diem, consumta. In neruos febri miliari laborantes, reactione quadam, a me non demonstranda, agendum esse, iudicaui, et ad hanc saccharum saturni elegi; et, si forsan insequentem bonum effectum, huic praesumptiuo reagenti adscribere non potui, de non insecuta quadam noxa obseruationem habui, quam candidus adieci. Priscis Medicis non adeo infamis erat eius vsus prouidus, vti *Schröderi Pharmacia*, tam in capite de saturno, quam in illo de nitro, hoc testatur. Egregius ille Medicus Scotus, *Pitkarn*, in suis Elementis, saccharum saturni inter remedia, sanguinis rareficientiam sedantia, locat. *Ettmüllerus* grana octo dat, pro dosi, Melancholicis, morbo saturnino laborantibus. Qua indicatione? Quo indicato? 8) *Comatosus stupor* si accedit conuulsionibus, mesenterii actio, hysterica dicta, communiter colludit: eleuata per eius spasmum intestina, manuali deuolutione, et fasciis ligatis remouenda sunt. Pro sunt praeterea commendata vesicatoria, dorsi frictiones, suppedalia, et oris et faucium diligentes, cum vino acidulo, syringationes. Praecedat hic stupor aliquando miliorum excretionem, adeo grauis, vt aegris non sentientibus, excrementa euacuentur: eodem modo, quo in aliis febribus continuis, comite stupore comatoso, contingit: sic, in Collect. Vratislav. 1726. Octob. pag. 474.

femina allegatur, quae a febre continua, cum surditate correpta, non obstante celebrata venaesectione, in tantum incidit stuporem, ut omnia excrementa, inscia, redderet. Tandem, cum omnia iudicarentur conclamata, aegra ipsa euigilans, vinum poscit, quo recreata, nouisque sic *vitae viribus fulcita*, adhibitisque temperatis bezoardicis, milia apparuerunt, et aegra pedetentim sanitati fuit reddita. Memini, hanc ad rem facientis cuiusdam observationis, de comatoso stupore, in viro, febre continua decumbente, quam addere, e re fore, duco: Medicus huius aegri autumabat adesse forsan in capite stagnationem inflammatoriam, et epithematibus vinosis illam resolvere tentabat (Cap. III. § 6.). Resoluebatur, quicquid fuerit stagnantis, pro hypothese; sed succedebat delirium furiosum, phrenitis, per biduum, et ad mortem durans. Forsan pristinam repletionem et stagnationem, totalis vasorum inanitio secuta est, delirii, uti in allegato casu, causa. In considerationem hic trahamus simul stuporem totius corporis, sensus neruorum externi, de quo querebatur aeger C. III. §. 6. 9) Mirabili autem symptomati, *Excretioni illi gelatinosae*, per aluum, si occurrere utile iudicaueris, grana duo camphorae, pilulis Becch. n. 7 vel 10. lege artis addita, spasticam illam lymphae extorsionem tollent. 10) *Sudor effusus urens* est symptoma, omnia fere reliqua, molestia superans: criticus, cum mentis constantia, et interpellante somno reficiente, tolerandus est, licet acidum spiret. Nec ideo, cum *Hamiltono*, acidum serum pro causa febris miliaris habenda



habendum; quia in sanis subiectis saepissime acidum spirat sudor. Vbi autem vigiliae, et mentis alienationes coniunctae sunt, ibi diureticis acidulis, gratis, vegetabilibus, citri, berberumque succo, melle pro gustu aegri addito, nisi contradictoria quaedam adsint, serum sanguinis ad renes amandandum est. Potus frigidulus, copiose, per moras, haustus, huic scopo velificabit. Serum lactis per quaevis acida paratum huc cooperabitur. Dorsum linteo, sebo hircino inducto tegendum, quo minus a sudore vratur, quod nullatenus nec sudoris repulsionem, nec praesentium vesicularum retrogressionem efficiet, nec exituras impediet: praeterea, et vesiculis, in totum non apparentibus, nerui, a sudore mitigato placabuntur. Quae sub his circumstantiis observatur 11) *urinae parcitas*, sudoris profluvio vnice est adscribenda: copia autem eius, absque biliosis mucosisque particulis, sedimentum formantibus, turbatam quidem per renes secretionem indicat, attamen, interdum crisin bonam agit. 12) *Diarrhaea* si incidit, cautissime roborantibus, leuiter amaris, e. g. rad. cichor. cort. cascarrillae, et talibus agendum; non adeo, ad diarrhaeam tollendam, quam ad tunicas intestinorum excretorias roborandas. Euacuantur enim sic salutariter oppilata viscerum vasa; ideo directe, neque opiatibus, nisi forsitan adfuerint conuulsiones, neque adstringentibus, contra illam agendum. Rhabarbari gr. 12 vel 15 etiam locum habere possunt. 13) *Frigus internum* aegros percellens, terrificum est symptoma, quod non quidem gangrae-

nam viscerum indicare crederem, sed neruorum quorundam internorum, innominandorum, debiliter iam oscillantium, substantiae compressionem, cum stupore, esse iudico: vel, quod rigor quidam affecerit leuis systema neruorum, ut aestum sanguinis non percipere possit. Certe specifico neruino medicamento hic opus erit; et hic locum inprimis habeat moschus, solus ad gr. x. datus, vel camphorae vnitus, ex sero lactis, cum vino canar. parato dandus. Symptoma puerperis proprium, et fonticum in hac febre, 14) est *lochiorum fluxus* parcus, vel plane retentus. Quemadmodum hoc etiam extra febrim miliarem graues parit sequelas, quidni comite illa. In omni puerperio itaque, statim huc est aduertendus animus, sub bono regimine, praesertim respectu potus. Iam, iam commendatum serum lactis, cum vino canar. paratum, lochia, et vrinam pellens, ipsis conueniens erit. Modestissima manualis abdominis commotio, et subditus saepe per diem pessus, ex linteo, sebo hircino obducto, hic multum valet. Si suaue ipsis olet empyreuma, extosis *Coffee* granis, et, si instanter potum inde paratum appetunt, suspectum aliquibus, quin vniuersaliter damnatum, signum sit restituti, et placati toni neruorum, empyreumatis actionem in se rursus fere adeo dulce ferentium, quam fumum ardentium, pro tempore, plumarum, et ardentem appetentibus concedatur eius lymphidi *aliquid*, ad placandam naturam, cum saccharo, cui guttula vnica olei aurant. vel lacinia cort. aur. recentis addita est. Cremor lactis autem, flatus et anxietates generans, absit.




§. 10. Colophonis loco. Febrim miliar-  
rem, sit idiopathica, sit symptomatica, negligenter tractare nolim suavior esse, multo minus accedere huic consilio, quod in hunc finem praebent Medici quidam. Negligentiae notio, vel terminus est valde generalis, omnis generis ataxias admittens miliorum excretio non est semper solum symptoma, sed saepe ipse neruorum morbus: et licet sit interdum symptoma, tamen eius numerosa vel non numerosa excretio neruorum statum indicat, et virium vitae discrimen. Qui denique, *vti Illustris de Haen fatetur*, interdum *ex admissa leuissima aura perniciose habent*, an negligenter illi sunt tractandi? Superent quidam feliciter negligentiam, an haec omnibus eueniet felix, et salutaris. Sic Medicus Polonus, qui Cap. II. §. 4. stragula remouit, et aërem frigidum in conclaue admisit, sanitatem omnibus non restitutam fuisse fatetur, sed quosdam (an hac methodo?) periisse. Accusat laxitatem habitus aegrorum sub hac methodo mortuorum: verum febris miliaris *communiter* est morbus habitus laxioris, neruis sensibilibus abundanter praediti. Ideo excretiones illorum, milia, praesente graui febre non flocci habenda. Sunt *communiter* naturae, non malae methodi, dudum inter Practicos, circa febres exanthematicas male notatae producta. Sic *Illustr. Störkius*, p. 32. *Anni medici*, de femina quadam notat, illam miliaria alba, *absque usu remediorum alexipharmacorum*, copiosissima habuisse, et mortuam esse. Apparet autem, *sudorem*, qui *tantus et adeo largus fuit, vt totus lectus in-*

*de maduerit*, adeo sanguinem exhaustisse, et nervos adeo grauter succo suo spoliasse, ut vires vitae omnes deficerent. Apparet itaque milia, et quidem copiosissima, absque usu alexipharmacorum gigni posse, nec semper sinistrae artis opus esse. Originem cepit haec opinio ex monitis iustis *Sydenhamii*, *Stablii*, aliorumque, de caute agenda methodo sudorifera, quae tandem ita inualuit, ut omnis sudoriferorum usus reiiceretur, perque vere frigida sudorem pellere tentaretur. Contra abusum alexipharmacorum in febribus acutis, ideo iam ab ineunte hocce seculo clamatum esse noui, dum adhuc Halae Magdeb. studiis incumberem, adeo, ut inde plebi, a morbo febrili acuto correptae, cum aegrotare inciperet, metus de miliis adfuturis nasceretur, et ideo Medicum anxie moneret, ne arte et arbitrio milia crearet. Arte creatores tamen habes, qui fumo succini illa exsurgere faciunt. Imprudens aeger morbi indolem ignorans, omnia Medici in manu posita esse putat. Vbi inflammationibus pulmonum, vel intestinorum, vel arthritidi iunguntur milia, quis aegros stragulis exuere audebit, dum hi affectus resolutionem per sudores poscunt. Criticos dari sudores in febribus acutis, quis nescit; an hos sufflaminare licitum erit, praesentibus miliis, antipraxia temeraria.

§. II Veras, indubias, manifestasque crises in febre miliari alba, videre, valde raro mihi contigit. Quas ita appellare potuerim, plerumque imperfectae fuerunt, et infidae.





## CAPVT VI.

*De Prognosi.*

**D**um aegris medicinam facimus, nunc nobis ipsis, nunc aegris, cum exquisita prudentia, experientiae innixa, probabilis de exitu morbi danda est Prognosis. Ex datis itaque in prioribus capitibus, huius febris casibus, cum eorundem euentibus, Prognosin de huius febris euentu formare studebimus.

Vesiculae miliares albae, pellucidae, absque febre, nullum inferunt periculum.

Vesiculae miliares albae, cum febre idiopathica, i. e. ipsis nervis primario patientibus, si numerosae sunt, periculum, per se, inferunt.

Vesiculae miliares albae, cum febre ex labe inflammatoria visceris, vel ex stagnatione humorum circa artus orta, vel variolis iunctae, per se periculum non inferunt: primarium enim momentum, circa primarium versatur morbum: attamen, quando in magna copia adsunt, morbum reddunt grauiorem, vehementer compatientibus nervis.

Febris miliaris alba sub larua catharralis interdum inuadit, et mox typum febris intermittens tertianae mentitur, cum insidiis clandestinis funestum exitum intendentibus. Miliis confertim apparentibus febris quantocyus cort. peruiano extinguenda.

Quo maiores anxietates, et brachiorum ardores, eo grauior morbus, inprimis, si modestis alui subductionibus non cedunt.

Quo effusior sudor in principio, cum pulsu exili, vel plane miuro, eo maius periculum: stagnat enim vbique sanguis, et cor eius sufficiente caret copia.

Eandem stagnationem in capite, et in pulmonibus genarum indicat rubor.

Diu suspensa excretio muci narium, et vrinæ mala.

Vrina cocta, copiosa, inprimis, cum multo sedimento, spem boni exitus alit; non cocta, copiosa tenuis, non mala, ceteris paribus, conf. Cap. III. §. 10. et Cap. II. §. 4. et Cap. IV. §. 8.

Cutis valde emarcida, flaccida, male. Quo magis enim reticulum nerueum atonia laborat, eo flaccidior cutis.

Strangulatio faucium, cum viscido, male: attamen eius copiosa excretio bona.

Comatosus stupor, cum involuntaria excrementorum solutione male: attamen, ceteris leuioribus apparentibus, non desperandum.

Subita halcyonia, vti in omnibus febribus malignis, ita hic communiter malae fidei sunt; nempe, quando aegri se non iectigant, sed insonnes, auribus susurrantibus, de nullo queruntur incommodo, oblatos cibos non recusant, quin auide comedunt, pulsusque illis nec debilis, nec valde febrilis est. Hic status spem aliquem incautis faciens, saepissime subito in contrarium vergit: mox enim inquieti fiunt, deliriosi, pulsus  
fit



fit debilis, cum rythmo, toto febrili, tendines in carpis et in facie subfiliunt, frigent manus pedesque, respiratio fit citatior, nervi faciei toti collabescunt, et tandem respiratio, et cordis motus cessant. *Iunckerus*, de febre miliari agens, studiosum allegat, erumpente purpura alba, animam efflantem. Miratur, durante morbo sudasse, bene ingessisse, neque sibi de cibo, vel potu aliquid detraxisse, triduo autem post, ab excretionem purpurae, nempe die vndecimo, summa auiditate, duplam cibi portionem deuorasse; qua ingesta, se statim moriturum dixisse, in lectum se reposuisse, et statim obiisse. Voracitas aegri durante morbo, certe fuit deliriosa, non admodum rara, febre acuta decumbentibus. Adsunt communiter anxietates, syncopem adpropinquantem indicantes, quae ingurgitationem talem, hypochondria expandentem, sequitur. Conf. I. §. 2. ubi mucilaginosus et butyraceus cibus syncopen induxit.

Iam iam notata faciei collabescencia hoc addere nos monet, quod communiter pallefcant aegri, in hac febre, vel ad minimum coloris naturalis maneant; indicio, ubi pallent, nervos debiles esse, ubi autem color naturalis perstat, vasa sanguifera faciei, ad dilatationem, a sanguine aestuoso, atonia aliqua, iam inepta reddita esse. Quando autem rubor genarum, per maculas distinguitur, valde incompleta vehi, et circulare sanguinem, certum est signum.

Convulsiones, modo sint somno interpolatae, non adeo periculosae sunt, quam deliria.

Rugiens

Rugiens venter, malus est nuntius.

Animi deliquia periculum non augent, nisi reliquis prauis.

Vigiliae soporiferis moderatis non cedentes malae.

Diarrhaeae pertinaces, inprimis cum delirio, malae.

Frigus internum pessimae prognoseos est.

Quo magis frigoris sensus in cruribus sentitur, eo grauior est morbus, eoque magis a passione participat hysterica et hypoch.

Vomitus, cum susurro aurium, et leui delirio, reliquo morbi statu ancipiti, mortem apoplecticam appropinquare indicat.

Puerperis, si lochia debite excernuntur, reliquis rebus, licet dubiis, existentibus, non desperandum.

Grauior solet esse morbus puerperis, quae tempore grauiditatis ab aestibus volaticis multum vexatae fuerunt.

Vetulis non adeo funestam esse hanc febrim discimus ex Coll. Vratisl. Ao. 1725. mens. Sept. Art. II. in casu, quem dant de Vetula, quae post perpeffas hystericas conuulsiones illa laborauit, et feliciter euasit, aliis, itidem antea motibus conuulsiuis correptis, succumbentibus. Idem refertur Ao. 1721. Nempe mortuos esse multos iuniores et infantes, purpura alba, non autem senes. Non adeo feruidus et acris, sanguinemque in putredinem agens videtur fuisse illorum sanguis: refertur enim ibidem cadauera purpura alba demortuorum, mox in putredinem cessisse; excepto illo



illo iuuenis, cui per morbum ad mortem vsque sanguis ex naso, et ano fluxit, sine dubio, fermentatione putredinosa, peracta et finita. Conf. de Immunitate Senum, quoad morbos, Tractatus de Senio. Erford. 1760.

---

## CAPVT VII.

*De Praeservatione.*

## §. I.

**Q**ui periculi occasiones euitat, ipsum euitat periculum, et se ab ipso malo, periculum insequente praeseruat.

§. 2. Febrim nostram miliarem, si euitare cupimus, quomodo occasiones periculi, ad illam ducentis, euitabimus? Euitabimus, si sanitatem illaesam seruabimus. Ast hoc idem per idem est. *Certum* itaque modum periculum febris miliaris euitandi docere nequeo, quemadmodum *certum* modum febres tertianas, et malum hypochondriacum euitandi docere nequeo: dico *certum* modum. Nam, licet per rerum non nat. iustum usum multi morbi, et ita etiam febres intermittentes, et malum hypochondriacum saepe praecaueantur, *certum* tamen per modum id patrari nequit, quia non solum tempestates aëris multum imperii in nostrum corpus habent, quas mutare, vel euitare non valemus, sed saepe interna nostri corporis dispositio ad malum hypochondriacum, quin

quin ad febres intermittentes, subdolas egit radices. Hinc tempore hyemali, vel verno, quando febres intermittentes, ex rerum non nat. prauo usu, per hyemem exercito, grassantur, communiter et febris nostra miliaris regnat: licet, per Dei gratiam sporadice tantum, non epidemice. Si rerum nat. abusus febrem hanc primario generaret, plebis foret morbus, intermittantium more; ast tenerorum plerumque est subiectorum, et lautioris conditionis, in quae aër plus exercet dominii, quam in robustiore plebe, licet non abundantur reliquis non nat. rebus. Facilius teneriorum neruorum succus idiopathice, et symptomatice in aliquem intemperiem labi potest. Quo modo, vel arte, praeterea, a subitis animi passionibus, quae, vti supra monstrauius, febris miliaris euidentes, immediatae, factae sunt causae, praeseruandum. Valde itaque *incertum* est, causas istas innumeras occasionales, quae communiter culpantur, hanc procreare febrem, et simul difficile, *certam* praeseruandi dare instructionem.

§. 3. Dolendum autem maxime, quod *puerperae*, ab vteri onere liberatae, post exantlata graua grauiditatis incommoda, nunc in portum salutis se translatas esse putantes et confidentes, in periculosum hunc incidunt scopulum, et saepe naufragio pereant funesto, hocque non ex vitio constitutionis aëris, vel rerum n. n. certo abusu, sed ex domestico quodam, grauiditatis tempore generato et nidulato vitio. Laboratum quidem latis est pro illarum incolumitate, tempore



pore grauiditatis, acquirenda, variis consiliis; hacque occasione maxime inculcata fuit incauta diæta, et abusus potus Caffee. Quis autem non crederet febrim hanc miliarem, ante potum hunc epidemicum, et nunc endemium factum, non fuisse puerperis familiarem, cum primario, quin vnice radicetur in turbis hypochondriacis, tempore grauiditatis natis, quas euitare nunquam potuerunt? Stagnationibus, et infarctibus sanguinis in abdominis visceribus, ob sanguinis menstrui per nouem menses retentionem, qui per hoc tempus, nulli depurationi, si non dispositioni ad putredinosam fermentationem vocauit. Inde enim systemati neruoso, maxime autem plexibus mesenterii nutrimentum male paratum fuit; licet idem sanguis per abundantem illorum fotum, illos fortiores reddere potuerit, quod tamen, finire in dispositionem ad spasmos declinauit.

§. 4. Haec, licet ita se habeant, illas tamen omni priuare consilio impium foret. Consultum itaque ipsis sit: 1) Sanguinem, per grauiditatem, tribus vicibus, pro subiecti tamen ratione, per venæsectionem minuere, nempe circa finem mensis tertii, et mensis sexti, et decem vel duodecim diebus, ante partus tempus: septem vnciarum quantitate, et quidem semper securius in brachio, quam in pede, in primis vltima vice; 2) obstructionibus alui, quantum possibile obuiam eant, quo recrementa, non solum ex cibis, sed etiam ex sanguine perpetuam habeant exonerationem: ipsoque instante partu, vel clysmate,  
vel

vel grano vnico aloës hepaticae aluum euacuent. Inſeruiunt huic ſcopo pilulae mites aloëticae; 3) potu ſufficiente vtantur, frigidulo, ex cereuiſia tenui, vel, quod praestat, aqua, in qua panis bis-coctus, ſapidus, maceratus eſt, quo ſerum bilioſum, viſcidum, per renes abundanter ſecernatur; nam, licet huic ſcopo etiam potus calidus ex Thee vel Coffee faueat, tamen horum potuum calor comes, accedente forſan ſimul eorum abuſu, flatulentiam quaſi hyſtericam parit, vel ad minimum eius fundamenta ponit, et inteſtina debilitat. Concedantur tamen quando lochia in puerperio morantur; 4) hauſtulum vini rhenani vel moſcellani interdum capiant, vel ſerum lactis vino canarienſi paratum, niſi ſoda, vel alio id prohibente primarum viarum incommodo laborent; 5) ſi ab aeſtu volatico vexantur, et hic venaſeſtioni non cedit, puluere abſorbente nitrato vtantur, vel, recipe potius, nitri depurati drachmam unam, liquor. nitri fixi, ſcrup. 2. lap. cancer. ſcr. 4. aquae font. vnc. 6 vel 7. miſce. Capiant ex agitata mixtura ſaepe cochlear. 6) motum viribus aequantem exerceant; 7) hypochondriis, coſtis ſpuriis, applicetur, vltimis menſibus, fascia ampla, abſque conſtrictione, cui emplaſtrum de Galbano inductum, ſuperinſtrato linteo tenuiori, contra moleſtam adhaeſionem, quo muſculi abdominis, thoraci inſertis, et reſpirationi ſimul inſeruientes, roborentur, nec faſciis poſt partum fortiter circumligandis, pro muſculorum ſuſtentatione opus habeant, quemadmodum, in praesuſumenda illorum debilitate, communiter, hoc auxilium ſibi recte poſcunt.



§. 5. Alius conditionis homines caueant sibi a viscerum oppilatione et infarctu; si enim in tantum infarctus, inflammationis genitor, increfcit, vt inde febris accendatur, tunc, docentibus id, fupra allegatis cafibus, axanthemata miliaria, vel alia symptomatice apparebunt. Difcant euitare morbos neruorum memoratos, arthritidem etc. Tò quomodo autem cauere, et euitare, vfus iuftus, quantum valet, rerum n. n. docebit, nifi aëris quaedam fpecialis conftitutio latentem iam, ex quauis caufa, fomitem, excitet, et ex fcintillis in flammam incendat.



## ADDITAMENTVM.

Cum poftliminio, Medici Angli, *Fordyce*, Hiftoriae Febris miliaris, Londini 1753, editae, compos factus fim, et contenta quaedam huius Tractatus partim adoptem, partim thefi meae contraria videam, cum doctiffimi, et fagaciffimi Auëtoris pace, colophonis loco, quofdam eius aphorifmos perluftrare, et quae in illis meae quadrant thefi, illis inhaerere, contraria vero notare, et ponderare mihi liceat, inprimis, quia hic liber, vti opinor, in Germania adhuc rarus eft, multis vfibus tamen locuples.

Praefando Cl. Auëtor pag. 2. notat, non de-  
 efle homines, qui huius morbi exiftentiam prorsus renuant, quamuis vix alius frequentius in  
 vtroque fexu, omni aetate, temporeque, fiue fe-  
 H orsim,

orism, siue aliis morbis intertextus reperiatur; imo aliquando epidemice grassetur.

Sic *Hamilton* in suis historiis de febre militari queritur associatos sibi interdum fuisse medicos, hunc morbum ridentes, et vilipendentes. Addit autem (recte) quo non calido regimini, aliue inepto debeatur haec excretio, quia etiam tenui diaetae deditis temperatissimis, et quibus humor serofus, admodum iners abundat, praecipuum faceffit negotium.

Pag. 3. Afferit malum hoc aliquoties magnopere epidemicum reperiri:

„Hoc apud nos aliquando factum esse, non  
 „memini. Seorsim potius, et sporadice  
 „saepius obseruata est,,.

Ibidem Auctor contrarius est illorum sententiae, qui opinantur morbum hunc alterius esse symptoma.

„Id quod tamen saepius esse supra ostendi,,.

Ibidem. Morbum idiopathica prodere sua signa, nec alium morbum tantum prae se ferre languorem, spiritus difficultatem, mentis alienationem, circa praecordia oppressionem, in ventre tormina, sudores effusos, horrores exanthemati praecedentes.

Quidni magnum prae se ferret languorem, neruis grauiter laborantibus? mentis autem alienatio in febribus petechialibus grauior esse solet. Ventris tormina spasmo mesenterico sunt conuenientia: interim nobis rara.



Pag. 4. Cum multis aliis laboriosissime Auctor in natales huius morbi inquit, aequae ac multi alii in natales luis venereae, idque vnice ex hac causa, quia apud veteres, disertis verbis illorum malorum non facta fuit delineatio, quin pictura. Quis autem in tantum crederet mutatum esse genus humanum, quod, si non ab origine eius, et ante diluuium, ob omnes peccatorum et criminum modos generi humano, ad eius fere interitum, effusum, tamen a reliquis millenariis, abusus veneris non procreauerit malum, nostro tempore Neapolitanum dictum; (cum tamen de illo, apud Chineses iusta sit opinio, quod ibi floruerit, quamdiu excessus floruit veneris.) et quod a millenariis hisce fluidum elasticum nervum non produxerit purpuram albam, nec idiopathice, nec symptomatice. Ao. 1760. per viros militum, qui in Prussiam Germaniamque profecti erant, in Liuania remansas, lues venerea, rusticis epidemica euadebat, ignota fere huc usque huic genti. Ecquis autem inde inferret ignotam ante plane fuisse luem hanc in Liuania. Interim huic tempori nunc Epocham luis venereae dant rustici, et dabunt. Abusus commercii venerei, cum feminis, a maritis remotis, in causa erat, epidemiae huius. Certe, quas Valesius, (pag. 9. citatus) *Welsch*io Lipsiensi, seculum prior vidit asperitates milii granis similes, et post hunc (pag. 10) *Forestus* et *Fernelius*, iam ante *Valesium* extitisse credere licebit. Qui ante *Welschium* et *Valesium*, reliquosque hanc tractauerunt febrim medici, sine dubio cum illis, qui

(pag. 2.) citantur ab Auctore, eiusdem opinionis fuerunt, exanthemata nempe esse vilipendenda. Opera, exemplis, monitisque sedulis grauium medicorum, *Bagliui*, *Sydenhamii*, *Stablii* etc. exacte morbos, lynceisque oculis, perspiciendos esse vrgentium, vel aliquorum fortuita sagacitate factum esse videtur, quod tandem innotuerit melius hic grauis morbus. Cum sub initium huius seculi Saxones Rigam obsiderent, medici Rigeneses prima vice purpuram albam, in feminis quibusdam, quarum quaedam illa moriebantur, moniti etiam a *Welschio*, obseruabant, et multis execrationibus comitabantur globos tormentorum a muris, in hostes proiectos, quod, cum muros ipsi transcendere nequirent, tamen contagio per aërem communicato, incolas vrbs offenderent. Quis autem crederet purpuram albam, ante obsidionem Saxonicam, de cetero non terrificam, sed laxam, negligentem et benignam, incolis Rigenensibus nunquam fuisse infensam. Ita etiam in Eph. Nat. Cur. D. I. A. 3. Obs. 281. adeoque in seculo praecedente medicus Poloniensis miratur eandem febrim in Polonia videre, quem *Welschius* Lipsiensem esse dixerat, in puella duodecim annorum, more antiquo, alexipharmacis, et expellentibus, curata. Aderant autem simul alii, qui morbo eodem se decubuisse testabantur.

Pag. 18. Celeb. Auctor opportuniores huic morbo censet omnes, qui sero abundant acriori, minus spirituofo: qui cibo vtuntur nimio, inertii, viscido, vappido, quique se desidiae, aut molli-

tici



tiei dedere; quique ex imbecillitate valetudina-  
rii sunt, et qui luctu protracto, iracundia, vel  
metu graui, neruorum intentione, perturbatione  
multati sunt, aut vitali nimis exantlati latice—  
qui potu calido, tenui, aquoso, diu nimiumque  
abusi sunt. Prae omnibus autem dolet puerpe-  
ras hac iniqua forte luctatas esse.

Prae omnibus, sane, grauem luctam cum  
hoc morbo habent puerperae, non equidem,  
quod inertii laborent, vel abundant fero, acriori,  
minus spirituofo, nec, quod vitiis diaetae se de-  
dent, sed ex grauioribus rationibus, Cap. IV. al-  
legatis. Praeter illas adhuc multi laute viuentes  
hoc morbo laborant. Metum grauem, vel terro-  
rem neruorumque aliam intentionem e. g. in Neo-  
nuptis Cap. III. procreasse hunc morbum docet,  
sub quauis conditione, et crasi sanguinis.

Potum calidum, tenuem, aquosum hunc ge-  
nerare morbum autumat Auctor Cl. et sine dubio  
abusum Potus Thee et Caffee subintelligit: sunt  
autem plures, tales potus non potantes, tamen  
huic morbo obnoxii facti. Quid de Chinenfi-  
bus hydropotis fieret?

Contra variatum victum ab omni tempore  
clamatum est, quando noui, ad minimum, diu  
non visi morbi apparuerunt; verum, nisi in to-  
tum victus est variatus, e. g. per transitum a toto  
vegetabili, in totum animale. Nouis eduliis  
autem interpellare veterem victum non adeo  
noxium erit, nec crasin sanguinis primigeniam

mutabit multoque minus praecise, purpuram albam procreare valebit.

*Aphorismorum amica perlustratio.*

Ad §. 1. 2. Recte existimarunt omnes febres continuas populariter dispersas aliquid peculiaris communis putredinis redolere: non excludendam autem esse causam communem huius febris popularis; et omnem dispersionem vnice contagio attribuendam esse puto, quia quodlibet subiectum, pro receptiuitate sua, ex causa communi, lateat illa in victu, vel in aër, qui magis subito inficit, et alterat nostrum sanguinem insensu influxu, affici potest. Tanta autem, per Dei gratiam, non fuit vbera huius febris apud nos seges, vt per vrbes et per agros, iisdemque in domiciliis, plures simul correpti fuerint, quantam refert Cl. Auctor.

Ad §. 3. Quam passus est Auctor a Puerperis, quibus in partu opem tulit, purpuram, sudori acri, ex sanguine parturientis feruente attribuenda fuit. Quia autem neruis eius se insinuauit, ideo illa passus est symptomata. Sic qui anthraces tractant Chirurgi interdum iisdem afficiuntur, communiter tamen leuiter, per externum contagium.

Ad §. 4. Maritum, et vxorem, abortu liberatam, simul, eodem tempore, et eodem in cubiculo, purpura laborasse, euident docet contagium.



Ad §. 6. Verno tempore, cum febres intermittentes nobis sunt familiares, etiam apud nos vigent.

Ad §. 8. 9. Anxietas, et irrequies incredibilis, cum languoribus primaria sunt signa accessurae febris miliaris; neruorum ex constrictione, vel atonia circa diaphragma promanantia.

Ad §. 11. 12. Obnoxii sunt hisce oppressi-  
bus, languoribus, strangulationibus hypochon-  
driaci, et hystericae, neruorum turbis multum  
vexatae, et licet petechias saepe comitentur an-  
xietates, et pectoris oppressiones, (non aequae ta-  
men morbillos, variolas, febrim scarlatinam, ali-  
asque exanthematicas) attamen, quas patiuntur  
aegri in febre miliari anxietates, maiores sunt, et  
fontem systematis neruosi magis colludere indi-  
cant, simulque neruorum succum magis laborare,  
quam sanguinis temperiem, extra dubium ponunt.

Ad 15. 16. Hunc horrorem, mox, et imme-  
diate partum inscutum esse saepe obseruaui,  
absque insequente purpura. Originem suam  
partim, a refrigerio sub partus laboribus perpe-  
ssso, partim ex commoto sub partus labore syste-  
mate neruoso habet.

Ad §. 17. 18. Debilitatem magnam indicant  
sudores spontanei, nec lecti calore, nec medica-  
mentis elicitii, et ideo male semper calido regi-  
mini adscripti. In neruis autem haeret debilitas:  
haec audiat  $\tau\omicron$  malignum.

Ad §. 27. Specialis hic odor forsan volatilitati succi neruei tribuendus est.

Ad §. 28 29. Variat certe eruptio secundum diuersum vitii fomitem, et praecipue secundum aegri constitutionem: ideo criseos naturam raro induit iustam Ordine maxime incerto erumpunt.

Ad §. 31. Tantum interuallum in vnica femina, quam supra adduxi, quae abortum trigenorum fecerat, vidi: cuius febrim etiam nervosam appellasse iustum fuisset.

Ad §. 34. Vbi larga excretio, ibi raro simul et semel excernuntur; ergo nec simul et semel maturescunt. Citius se insequuntur morbilli et varioli, et illis familiarior est saliuatio, tumori genarum, et glandularum saliuarium debita.

Ad §. 36. Primarium sane sit hic opus ataxiam neruorum in ordinem redigere.

Ad §. 39 - 45. Respiciendum est in his ad fabricam systematis neruosi feminini, quod magis viuax, irritabile et ramificationibus neruorum magis repletum est, quam illud masculorum. Hinc et mares temperamenti feminei vehementius hac febre laborant. Cur autem puerperis id fiat vide Cap. IV: §. 13. Praeterea febricula ad mentem Auctoris, qua laborarunt grauidae, et illa, sub partu, protracto enitendi labore, defatigatio, magnam sane dispositionem ad febrim miliarem parauerunt. Inde itaque systema neruosum non solum valde labefactatum, sed et fluidum nerueum intemperie p. naturali affectum esse sentias.

Ad



Ad §. 48. Quando hæc symptomata loca occupant varia, non decubitus materiae malignae hoc attribuendum esse autumo, sed spasmu nervorum, hunc, vel illum locum magis occupanti. Si autem forsan diarrhaea accedit, id per atoniam intestinorum contingit. Quod vterum specialiter obsideat hoc vitium, et quod obstructio, phlogosis, et infinita malorum caterua inde generetur, de hoc dubito: ipsas strangulationes et lypothymias vtero etiam attribuere nequeo, sed spasmu nervuorum mesentericorum, consentientibus licet vterinis.

Ad §. 51. 53. Non delituit, meo iudicio, materia pustularum in venis, et quando natura succumbit, ab exhaustis et succumbentibus nervis succumbit, id quod Apoplexia et Syncope, vitae filum ocyus abrumpentes, euidenter produnt.

Ad §. 61. 62. Idem me sentire innui; nec sub magna excretionem pustularum res aegri salvas esse; delitescat in venis adhuc copia feri acris, vel non: modo materiae halituosae p. naturalis copia in nervis non restet, ex qua res male cedat.

Ad §. 67. Sufficiunt sudores frigidi, cum pulsu vacillante, absentibus licet reliquis malis symptomatibus, rem pessum iri indicantes.

Ad §. 68. 69. Haec, talia, dolores et tumores crurum, etiam absente purpura, puerperas aliquando infestant.

Ad §. 75. Omne inopinatum delirium, cum vigiliis, febre nullatenus mitigata, suspectum est. Somno autem interpellatum, et leue, nil portendit periculi.

Ad §. 85. Sedata febre, res omnes in saluo sunt. Si ratio adest aluum subducendi, clysmate emolliente, nil periculi suberit.

Ad §. 88. Absentibus licet pectoris oppressio- nibus, anxietatibus, obscuro, et frequente pulsu, purgantia, quouis morbi tempore exhibere non sim Auctor: vires enim vacillantes destruunt, et diarrhaeae intempestivae periculum inducunt. Conf. Cap. III. §. II. Prosper sit semper successus!

Ad §. 49. Licet incommodum videatur Cel. Auctori, venam, malo inuadente aperire, ubi etiam vires id sinunt, quum res, nullo sanguine detracto plerumque feliciter peracta fuerit, tamen retentis lochiis, vicarium auxilium per venaesectionem est quaerendum, et in febribus inflammatis.

Ad §. 97. Verosimillimum est imbecillitatem pulsus ex spasmo cordis nasci, et arteriam ex hoc se explicare nequire. Deteruntur eo magis cordis vires, et faciunt sic rem valde dubiam et formidabilem.

Ad §. 98. Verissimum effatum. Symptomatum magna habenda est ratio.

Ad §. 100. Commendata hic venaesectione videtur §pho 94. contradicere.



Ad §. 111. Purgantia hic diffuadentur, nisi vrina concocta etc. Conf. §. 88.

Ad §. 113. Quibus instante partu, vti solet, sponte laxatur aluus, illis non opus erit commoventibus. Melius etiam erit, quando aluus sua sponte non laxatur, illam leui dosi Aloës, instante partu subducere, quam a partu. Conf. C. VII. §. 4.

Ad §. 119. Fauet etiam viribus, nec non spasmu remissioni lectis tepor.

Ad §. 120. Deficientibus ad respirationem viribus, et sanguine existente vappido, commotio corporis respirationem intendens, non solum lypothymias, sed syncopes lethales, vti in scorbuto, improuisam saepe aduocat mortem.

Ad §. 122. Infusa calida, herbis aromaticis et quouis spiritu volatili alcalino, grato, grauida, affatim potare, non sum Auctor. Quantumuis enim ad vires fulciendas apta esse videantur, attamen sudor inde proueniens effusissimus illas magis destruet. Ad eliminandam, pro hypothesi, peccantem humorem tepida sufficerent, quin frigida, non tamen auide pota, sed pedetentim, in copia sorpta. *Tò festina lente*, quod *Hamilton* in Tractatu de Praxeos regulis commendat, non tamen, respectu sudoris, obseruat, commendando infusa calida affatim pota, valde laeditur.

Ad §. 124. Pauperes rarissime hoc morbo defoedantur, quia neruos possident temperiei stabilioris. Interim nec Caffee, nec Thee potus vnquam

quam causae fuerunt purpurae albae. Chinesium enim et Turcarum foret morbus endemius antiquus: quin etiam in Europa iam inter plebem grassans, quod tamen non est.

Ad §. 127. A priori quidem Caffee, ceu vstulatum quoddam, lochia cohibere posset, potu non existente limpido, et granis vstulatis admixtis in puluere. Verum, ipsae puerperae, ob magnam neruorum in primis diebus solitum languorem hunc potum non sollicitant; robore autem neruis aliqualiter reddito, empyrevmatis huius titillatio et oscillatio in neruos, illis odoratu et gustu analeptica est.

Ad §. 128. Ruētus acidi, vomitus etc. statum aegri hypochondriacum inuoluunt, contra quem, pro re nata, alcalinis, liquore nitri, pugnandum. Non autem ideo pustulae miliares, albae et pelliculae ex prauis sanguinis humoribus, particulis Coffee grauidis, vel aliis deducendae sunt, alias crudiores forent efflorescentiae, vti reuera, sat crude et latae, mitissimae tamen de reliquo, in hypochondriacis et hystericis, absque febre, excerni solent.

Ad §. 129. 130. Deferuente febre, cochleare vnum aut alterum vini generosi aegro non dene-gandum esse, cum Cel. Auctore quidem conuenio: ast supersedere fere possent tunc vino aegri, febris cum iam deferbuit. Verum, praesente febre, vinum generosum, vires, spiritusque reficiens, et ad extremitates permeans, neruos torpentes



pentes expergefaciens, frigidos fouens, madorem diffluentem coercens, animum languentem fulciens, et delirantem demulcens, (pro bella Auctoris pictura) *prouide et prudenter*, lymphatum, vel lactis sero mixtum, per totum morbi decursum propinare, omnino licitum, iustumque fit.

Ad §. 131. Vtique spes conualescentiae, aegris omnibus, inprimis autem meticulosis, semper facienda est. Sint autem crocus, castoreum, vinum, et succinata, vtpote physice in neruos operantia, prudenter adhibita, illi ideali medicinae, auxiliaria.

Ad §. 136. In febris, vbi vigiliae, et inquietudines pessima inducunt mala, nil praestantius somno, modo tuto fieri possit, addit Auctor. Verissimum hoc est; et quaerere licet, quam ob rationem, in hoc morbo, non modo pari, sed potiore iure, quam in multis aliis, opiata, tuto, feliciterque exhiberi possint; cum somnus multus tantam hic polliceatur securitatem. Possunt itaque dari, sed manu suspensa, et sub vesicatorium, et pro re nata venæsectionis, vel haemorrhagiae narium societate. Multus somnus autem non semper dat certam, sed malefidam securitatem. Cum tetano oris coniunctis miliis largiter adhibitum opium vidimus, Cap. IV. §. 17.

Ad §. 145. 146. 147. Vesicatorium non iniusti Buccinatores. Interim ex illis non semper desideratum auxilium. Vires illis vnice datae, mediante

diante inflammatiuncula cutanea, tonum neruorum et valorum sustentandi, quin augendi. Quod enim seri feruidi educunt, certe parum est. Quae, in sequente §pho 150. in ipsa diarrhaea, praeter rhabbarina, et alimenta gelatinosa, suris applicanda commendantur vesicatoria, ob sympathiam, quam habent cum intestinis, aliisque imis partibus, in hoc cum suppedalibus conueniunt, quae etiam neruorum superiorum excitant consensum. Interim, si complicita iudicatur intestinorum inflammatio, vesicatoria in cruribus absint.

Ad §. 148. Periculum, quod diarrhaea inducit, non adeo in materiae cuiusdam acris, per cutim excerpendae retrocessione, quam in destructione virium per euacuationem humorum, tam malorum, quam bonorum, mediante atonia intestinorum, excretorum, versatur: nisi per alleviationem, vel virium constantiam, appareat esse critica.

Ad §. 152. Dolorem vel tumorem extremorum in febre miliari obseruasse non memini. In principio morbi leuior crurum spasticus dolor adfuit.

Ad §. 159. 160. Subscribo legitimis et iudiciosis §sphis, de obseruando typo febris intermittentis miliaris.

Ad §. 161. Febris neruosa cum pustulis miliaribus diu protractis, Clar. Auctori forsitan est febris cum excretionem miliarum rubrorum. In  
purpu-



purpura sic dicta alba, pustulae diu protrahi non solent. Rarum enim est exemplum, quod supra de femina trigeminos abortiente attuli. Exceruntur die 5to, 6to, 7mo, 8vo, vel serius. Vbi autem, pro hypothesi, excretio peripherica expectanda, et simul diarrhaea timenda est, annon arduum et temerarium foret, colluuiem humorum morbosam, per intestina et aluum, per se, saepe nimis mobilem pellere. In principio morbi excrementa blandissime euocare vtile est.

Ad §. 162. Orexi, si fides, diaeta sit tenuissima: exclusis gelatinis carniuum, per coctionem, omni sale volatili priuatis. Conf. Cap. V. §. 7.

F I N I S.



